

SPALIO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2025 10 01 - 2025 10 31



Gyvensenos medicinos specialistas
Vytautas Vasiliauskas
mob. +370 698 49092

KAIP ĮVEIKTI ŪMINĮ BRONCHITĄ

Ūminis bronchitas – tai staiga prasidedantis bronchų gleivinės uždegimas. Jis dažniausiai pasireiškia kosuliu ir negausiu skrepliavimu. Sergant bronchitu kvėpavimo takai yra sudirginami, paburksta. Kvėpavimo takus dengiančios gleivinės ląstelės pradeda intensyviau gaminti sekretą. Kosulys pirmosiomis dienomis būna sausas, vėliau ligonis iškosėja gleivių ar pūlingų skreplių.

Kosėjimas yra organizmo apsauginis mechanizmas, kurio pagalba organizmas bando atsikratyti kvėpavimo takuose susikaupusio sekreto. Ūminį bronchitą dažnai lydi viršutinių kvėpavimo takų infekcijos būdingi simptomai: bendras silpnumas, prakaitavimas, gerklės peršėjimas ir skausmas, sloga, krūtinės spaudimo pojūtis, dusulys, švokštimas, nedidelis karščiavimas (iki 38-39°C), sąnarių ir raumenų skausmai. Pagrindinės ūminio bronchito priežastys yra bendrasis peršalimas, gripas, rečiau - aplinkos teršalai (cigarečių ir kt. dūmai, dulkės ir pan.).



FLAVAMED 30 mg tabletės N20 3⁵⁹ €

FLAVAMED 60 mg šnypščiosios tabletės N10 5²⁶ €

FLAVAMED 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas 100 ml 4²⁶ €

FLAVAMED 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas 100 ml 4⁴⁹ €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***


Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pašalinti. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletės reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigerti pakankamu skysčio kiekiu. Suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2-3 kartus per parą, pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą. 6-12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2-3 kartus per parą, 2-5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4-5 dienas Flavamed vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30 mg tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. Flavamed 60 mg šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamąjį tirpalą negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai. Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praėjusio buvus pepsinę opą; esant histamino netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed, jeigu jums praėjusio pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Flavamed 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamąjį tirpalą bei šnypščiosios tabletes yra sorbitolis bei benzenkarboksirūgštis. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių laisvinantį poveikį. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jį Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. Flavamed šnypščiosios tabletes yra benzilo alkoholio, kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač nėščioms ar žindančioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos. Reklama paruošta 2023m. gruodžio mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams 100ml

4³⁵ €

IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. 100ml

7²⁹ €



*Nereceptiniai vaistiniai preparatai***

Vienam geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtykite. Ibustar vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praėjusio buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetalisalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neiškištų kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praėjusio skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas iš smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtina simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėjus pirmųjų odos išbėrimo, gleivinės pažeidimo ar kitų padidėjusio jautrumo reakcijos požymių, Ibustar vartojimą reikia nutraukti. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėluoti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą ilgą laiką infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėžauriais reikia vengti vartoti Ibustar. Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn.

Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt



Pasiūlymai galioja 2025 m. spalio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvt.lt.

Dažniausiai ūminį bronchitą sukelia virusinė infekcija (apie 90% atvejų), gerokai rečiau – bakterijos ir kvėpavimo takų dirginančios medžiagos. Simptomai neretai prasideda praėjus 3-4 dienoms po viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir trunka 2-3 savaites. Tačiau negydančios galimos rimtos komplikacijos (lėtinis bronchitas, plaučių uždegimas ir kt.).

Susirgus ūminiu bronchitu rekomenduojama:

- kuo daugiau ilsėtis, išsimiegoti šiltai apsiklojus lovoje (taip organizmas energiją naudos kovai prieš ligos sukėlėjus);
- patalpas reguliariai vėdinti ir drėkinti sausą patalpų orą (papildomai įlašinus eterinio aliejaus)
- vartoti šiltus skysčius (tinka erškėtuogių, šermukšnių, šaltalankio ir kt. imunitetą stiprinančios arbatos);
- naudoti garstyčių trauklapius. Juos rekomenduojama lipinti krūtinės srityje, ant kojų pėdų.
- valgyti visavertį maistą, pasirūpinkite, kad su maistu gautumėte imuniteto stiprinimui reikalingų vitaminų (vitamino A, C ir E, cinko, seleno ir kt.). Vartokite imuninę sistemą stiprinančius produktus: bičių duonelę ir kitus bičių produktus, česnakus, gvazdikėlius, imbierą, krienus, medų.
- kelis kartus per dieną įtrinkite krūtinę, delnus ir pėdas šildomaisiais tepalais su eteriniais aliejais (eukaliptų, citrinų, kamparo, levandų, mėtų, mirtų, pušų, saldžiųjų apelsinų ir kt.);
- pajutus pirmuosius slogos požymius, kas valandą nosį skalaukite šiltu ir pasūdytu vandeniu;
- Gerkite medetkų, ramunėlių žiedų, šalavijo lapų ir kitas arbatas, kurios pasižymi antiseptiniu, priešuždegiminiu poveikiu;
- Vartokite aviečių uogų, liepų žiedų, šėivamedžio žiedynų bei vaisių ir kitas prakaitavimą skatinančias arbatas;

Norint nesusirgti rekomenduojama:

- stiprinti organizmo imuninę sistemą, daugiau būti gryname ore, grūdintis;
- neperšalti (kojos visada turi būti šiltos!);
- kvėpuoti tik per nosį (vengti kvėpuoti per burną, nes tai sukelia burnos sausumą);
- reguliariai plauti nosį virintu vandeniu arba 1% valgomosios druskos tirpalu (dar geriau – jonizuotu rūgštiniu vandeniu);
- valgyti visavertį maistą, gerti daug šiltų skysčių (ne mažiau kaip 6-8 stiklines vandens per parą).
- nuolat vėdinti, drėkinti patalpų orą, palaikant optimalią kambario temperatūrą (apie 18°C) ir drėgmę (30–50%);
- šalto sezono metu- tinkamai rengtis (nepamiršti šaliko, kepurės, vilnonių kojinių);
- nerūkyti, vengti prirūkytų patalpų, vengti tiesioginio sąlyčio su aplinkos teršalais;
- vengti visų imunitetą silpninančių faktorių;
- vengti oro kondicionierių ir skersvėjo.

Pajutus pirmuosius ligos simptomus svarbu kuo greičiau pradėti gydymą. Nedelskite ir kreipkitės į savo šeimos gydytoją, kuris jums paskirs tinkamą gydymą.

Linkiu Jums sveikatos!



1 83 €



IBUSTAR 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Indikacijos: Simptominis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo gydymas. Simptominis karščiavimo gydymas. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų vienkartinė dozė yra ½–1 tabletė per parą. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg (3 Ibustar plėvele dengtos tabletės). Vaikams Ibustar vienkartinė dozė 20 kg–29 kg (6-9 metai) ir 30 kg–39 kg (10-11 metų) yra ½ tabletės. Didžiausia paros dozė 20-29 kg - 1½ ir 30-39 kg - 2 tabletės. Vienkartinės dozės geriamos ne dažniau nei kas 6 valandas. Kontraindikacijos. Ibustar vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums, pavartojus acetilsalicilo rūgšties turinčių vaistų arba kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, yra buvę alerginių reakcijų, tokių kaip astmos priepuoliai; nosies gleivinės paburkimas; odos reakcijos; jeigu yra nežinomos kilmės (dvylikapirštės) žarnos opa arba kraujavimas; jeigu Jums yra buvęs su ankstesniu NVNU gydymu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo perforacija; jeigu Jums yra galvos smegenų kraujagyslių arba kitos aktyvus kraujavimas; jeigu Jums yra sunkus kepenų arba sunkus inkstų nepakankamumas; jeigu Jums yra sunkus širdies nepakankamumas; jeigu Jums yra paskutiniai trys nėštumo mėnesiai; vaikams, kurių svoris yra mažesnis nei 20 kg (jaunesniems nei 6 metai). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jei vartojant Ibustar pasireiškia kraujavimas iš virškinimo trakto arba opėjimas, vaisto vartojimą būtina nutraukti. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdamami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT_lbu_05_2024_V1_print Reklama paruošta 2024 m. rugsėjo mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

9 49 €



UMCKALOR® geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml UMCKALOR® 20 mg, 15 plėvele dengtų tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Lašai. 1 g (= 0,975 ml) tirpalo yra 800 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto (1:8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Tablečių. 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijų šaknų) skystojo ekstrakto, džiovinto (1 : 8 - 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. Indikacijos: Umckalor yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito simptomams mažinti, atsikosėjimui lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas. Lašai. Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, įprasta dozė yra: a) suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams gerti po 30 lašų 3 kartus per dieną, b) vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, c) mažiems vaikams nuo 1 iki 5 metų gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Lašus gerti su nedideliu vandens kiekiu ryte, dieną ir vakare. Tablečių. Suaugusiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Vartoti nekrmant, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. Kontraindikacijos. Alergija Pelargonium sidoides ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. (Papildomai lašams) jeigu sergate sunkiomis kepenų ligomis, kadangi nėra pakankamai patirties. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Umckalor: jeigu turite bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimų, jeigu Jūsų būklė nepagerėja per 7 dienas, temperatūra laikosi kelias dienas, pasireiškia bet koks pobūdžio kepenų veiklos sutrikimas, vargina dusulys arba atkistite skreplių su krauju, kreipkitės į gydytoją. (Papildomai tabletėms) Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

**SOLPADEINE 500 mg/8 mg/30 mg,
12 tablečių**

5 93 €

**SOLPADEINE 500 mg/8 mg/30 mg,
12 tirpinamųjų tablečių**

6 78 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***



Kiekvienoje tabletėje ir kiekvienoje tirpinamojoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 8 mg kodeino fosfato hemihidrato ir 30 mg kodeino. Terapinės indikacijos. Silpno ir vidutinio stiprumo skausmo (šnarių, nugaros, galvos ir migreninio, menstruacinio, neuralginio bei dantų) malšinimas. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugusiems: Solpadeine tirpinamosios tabletės. Po 2 tabletes išstiprinti ne mažiau kaip pusėje stiklinės vandens ir gerti nuo 3 iki 4 kartų per parą (pagal poreikį). Solpadeine tabletės. Po 2 tabletes, jei reikia, nuo 3 iki 4 kartų per parą. Negalima dozės gerti dažniau nei kas 4 valandas ir ne daugiau kaip 8 tablečių per bet kurias 24 valandas. 12–15 metų paaugliams: po 1 tabletę kas 6 valandas. Neviršyti maksimalios paros dozės – 4 tablečių per parą. 16–17 metų paaugliams: po 1–2 tabletes kas 6 valandas. Neviršyti maksimalios paros dozės – 8 tablečių per parą. Gydytojo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 3 paros. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti vaistą: Jeigu Jūs sergate sunkia inkstų ar kepenų liga; jei sutrikusi žarnyno veikla, įskaitant žarnyno veiklos sustojimą; jei Jums operacijos metu buvo pašalinta tulžies pūslelė; jeigu vartojate vaistų nuo depresijos arba kvėpavimo sutrikimų; jei vartojate vaistų nuo pykinimo, vėmimo arba padidėjusio cholesterolio kiekio kraujyje; jei valgoite maistą, kuriame yra mažai natrio. Kiekvienoje tirpinamojoje tabletėje yra 427 mg natrio; jeigu esate arba kada nors buvotė priklausomas (-a) nuo opioidų, alkoholio, receptinių vaistų arba neteisėtai cheminių medžiagų. Nevartokite per daug produktų, kuriuose yra kodeino. Kartu su šiuo vaistu nevartokite kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio ar kodeino. Kaip ir kitų opioidų, kodeino reikia vartoti atsargiai, jeigu Jūsų kraujo spaudimas yra žemas ar sergate hipotenzija, patyrėte galvos traumą ar turite padidėjusį intrakranijinį (kaukolės vidaus) spaudimą. Kontraindikacijos. Solpadeine vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms (paracetamolui, kodeino fosfato hemihidrato, kofeinui, skausmą malšinantiesiems opioidams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio; jeigu yra lėtinis vidurių užkietėjimas; jeigu yra kvėpavimo funkcijos nepakankamumas; jeigu buvo galvos trauma; jeigu yra padidėjęs intrakranijinis spaudimas; jeigu buvo atlikti tulžies lataktų operacijos; vaikams, jaunesniems kaip 12 metų; malšinti skausmą vaikams ir paaugliams (0–18 metų) po gerklių ir ryklės migdolų pašalinimo dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo operacijos; jeigu yra žinoma, kad organizme kodinas labai greitai metabolizuojamas į morfiną; moterims nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Reklamos teksto parengimo data: 2022-03-24.

**GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak.**

7 27 €

**GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak.**

7 85 €

**GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak.**

9 62 €

**GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak.**

8 32 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***



Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje: „Gripex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Gripex Thermal“ 300/20/5 mg: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Gripex Thermal“ 650/50/10 mg arba „Gripex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. „Gripex Thermal“ 300/20/5 mg: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojui, jei Jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatazės defektas arba metemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.



GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

5 98 €

GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tabletės

8 75 €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

6 33 €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tablečių

9 03 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Gripex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 10 mg dekstrometorano hidrobrodido. 1 tabletėje „Gripex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 15 mg dekstrometorano hidrobrodido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklių skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Gripex 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletes 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Gripex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; lėtinis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikusi mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančias šiais vaistais, neperatami vartoti alkoholiu. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2024-04-02.

**NUO PERŠALIMO.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!**



**DALERON COLD3 325 mg/30 mg/15 mg
plėvele dengtos tabletės N12 arba N24**

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorano hidrobrodido. Terapinės indikacijos: Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, šnarių, gerklių skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletes. Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išimtinė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinii, bėta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgęs miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktoriai. Sergama lėtininiu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonoji vilkligė, cukriniu diabetu, hipertirodizmu ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvę traukulius. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

**NUMALŠINA SKAUSMĄ
NET IKI 12 VAL.!**



3 87 €

NALGESIN S 275 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NALGESIN S 275 mg, 20 plėvele dengtų tablečių

5 40 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Skirtas galvos, dantų, mėnesinių, šnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 275mg natrio naprokseno. Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1–2 tab., vėliau – po 1 tab. kas 8–12 val. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų Nalgessin S plėvele dengtų tablečių vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinėjusi skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydymą pacientai, sergant epilepsija ar porfirią, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. Reklamos teksto parengimo data: 2024 09 18

UŽGESINA RĖMENĮ ILGAM!



3 78 €

NOLPAZA 20 MG, 7 skrandyje neiros tabletės

NOLPAZA 20 MG, 14 skrandyje neiurių tablečių

5 73 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neiurioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos. Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2–3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. Nolpaza nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Nolpaza 20 mg skrandyje neiurių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintais užgeriant skysčiu (viena tabletė). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ZIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nefliraviru, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardyti atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba būvę simptomai pasikaitė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolo dienos, tačiau kad būtų išnykę visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti puropendokrininių navikų tyrimus. Nolpaza tabletes yra sorbitolis ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartų vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data. 2024-09-17

-25%



DR. MÜLLER - maisto papildai* normaliai kvėpavimo sistemos, gerklės, ryklės, bei balso stygų funkcijoms palaikyti.

-40%

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!



„**VIRONOX**“ epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų. „**Stiprus imunitetas**+“ – organizmo apsaugai bei imunitetui. Vitaminas C, cinkas bei dygliuotųjų šaltalankių vaisių ekstraktai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Siekiantiems greičiau atgauti jėgas – „**Jėgoms atstatyti**+“. Ženšenis padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6, – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, mažinti nuovargį. Normalią raumenų funkciją ir kaulų būklę padeda palaikyti eukaliptų ekstraktas, o vaistiniai čiobreliai – normalią imuninės sistemos veiklą ir kvėpavimo sistemos funkciją. Vartojimas: 1 paketėlis per dieną. Balzamo „**Veiksminga apsauga**“ sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda suformuoti apsauginį barjerą. Vartojimas: balzamą tepkite ant lūpų ir nosies pagal poreikį. Rekomenduojama naudoti kaip pagalbinę apsaugos priemonę susibūrimuose.

Maisto papildai*

-35%

JŪSŲ GALINGAM IMUNITETUI!



Išsirinkite reikalingiausią ir pastiprinkite organizmą: „**Imuno C + Echinacea + Ginger**“ - Vitamino C su imbieru ir ežiuole "shot'as" milteliais – tavo stipriam imunitetui! „**bioVitamin C + Zn**“ – vitaminas C išgautas iš laukinių vyšnių – acerolos, papildytas cinko citratu! Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. „**ImunoX POWER 300**“ – vitaminas C, D ir cinkas. Net 300 % dienos normos imunitetui naudingų medžiagų viename pakelyje. „**bioVITAMINAS D3**“ - vitaminas D miltelių pavidalu! 1 pakelyje net 3000 TV Vitamino D3! Vitaminas D svarbus kalcio ir fosforo įsisavinimui, normaliai imuninės sistemos veiklai, kaulų ir dantų būklei. Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Izraelyje!

Maisto papildai*

-40%



„**CITO® FERRUM**“ sudėtis pasižymi inovatyvia liposominės formos geležimi. Pasirinktas geležies pirofosfatas yra geriau pasisavinamas lyginant su kitomis geležies formomis. Geležies įsisavinimas iš geležies pirofosfato priklauso nuo geležies trūkumo laipsnio: kuo labiau šio mikroelemento trūksta organizme, tuo geresnis jos įsisavinimas. Nedirgina skrandžio bei neturi geležies poskonio. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalų deguonies pernešimą organizme. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią kraujodarą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

-40%



„**Vitamin C prolong**“ kapsulės, „**Vitamin C PRO forte**“ greitų skonio kramtomosios tabletės ir „**Vitamin C prolong 1000**“ miško uogų skonio milteliai, kuriuose yra ir prailginto veikimo patentuotas vitaminas Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidimo bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Maisto papildas*

-30%



ISKIAL MAX, 120 kapsulių
ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių

„ISKIAL“ – ryklio kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklio kepenų aliejus – tai vienas turtingiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „ISKIAL JUNIOR“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, kurios svarbios normaliai smegenų funkcijai ir padeda išsaugoti normalų regėjimą. Tikis vaikams nuo 3 metų. „ISKIAL MAX“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

Maisto papildas*

1+1



HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių
Medicinos priemonė

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių

HERBITASSIN® INTENSE, 12 pastilių

Maisto papildai*

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.

HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt.

Maisto produktas

Herbitassin® įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kepenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis padeda palaikyti normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmą, mažina sauso kosulio ir užkirmos simptomus. Naujiena: Herbitassin® Intense – intensyvaus mentolio ir eukaliptų skonio pastilės gerklės ir kvėpavimui.

-50%



OTERINO nosies lašai (tirpalas) 10 ml

Natūralių aliejų mišinys skirtas nosies gleivinės drėkinimui ir komfortui palaikyti. Tinka vaikams nuo 6 metų.

BETA IMMUNE balzamas 120 ml

Su beta gliukanais ir šėivamedžio uogomis. Šėivamedžio vaisių ekstraktas, vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – itin grynai beta-gliukanai. Tinka vaikams nuo 3 metų.

RELAXOLS Stress skystis lašai 30 ml

Augalinių ekstraktų maisto papildas nervų sistemai ir atsipalaidavimui. Gudobelė padeda palaikyti gerą savijautą ir ramybės pojūtį, taip pat gali padėti palaikyti normalų širdies ritmą. Valerijonas ir melisa padeda palaikyti normalią miego funkciją. Tinka suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų.

Maisto papildai*

1+1

JAUSKIS LENGVAI – PASIRŪPINK VIRŠKINIMUI!



„**INULIN**“ – inulinas 6000 mg + paprastosios trūkazolės ekstraktas 25 mg. Paprastoji trūkazolė, inulinas padeda normaliai: virškinimo/žarnyno veiklai, virškinimo trakto skysčių gamybai ir skrandžio bei žarnyno judėjimo stimulavimui, laikantis dietos padeda svorio mažinimui, kepenų veiklai bei gliukozės koncentracijai kraujyje reguliuoti. „**BIO-SILYMARIN**“ – Ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai – silimarinas! Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią: kepenų ląstelių regeneraciją (atsinaujinimą), kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją, padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje. „**LAXMAC**“ – skaidulų šaltinis, senos lapų ekstraktas ir rabarbarų ekstraktas padeda normaliai žarnyno motorikai ir veiklai. „**URITA**“ – produkto sudėtyje stambiauogės spanguolės, miltinės mėškauogės. Mėškauogė padeda palaikyti normalią šlapimo pūslės/takų veiklą. Be kvapiųjų medžiagų, be dažiklių, be konservantų. „**CLEAN ME**“ sudėtyje baltšvieji gysločiai, linų sėmenys, gliukomananas, rugių skaidulos ir kalcio mineralas žarnynui ir virškinimui, svorio kontrolei. „**MAGNULIN**“ – magnio, inulino ir paprastosios trūkazolės kompleksas, normaliam virškinimui, kepenų veiklai ir raumenų funkcijai palaikyti. 1 pakelyje – net 300 mg magnio ir 3000 mg inulino.

Maisto papildai*

-25%



Maisto papildai*

ATERO CHOLESTEROL, 30 kapsulių

Dažinių ciberžolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio lygį kraujyje, normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją, normalų kepenų lipidų kiekį. Cholinai padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą, normalią lipidų apykaitą, normalią kepenų veiklą. Foliatas padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą, normalią kraujodarą.

TABLETĖS ŠIRDŽIAI, 50 tablečių

Vienapiestės gudobelės, vaistiniai valerijonai, padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Pipirinės mėtės padeda atsipalaiduoti. Rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną.

DIAWELLCAPS, 30 kapsulių

Celioninio cinamono žievės ir tikrųjų imbierų šaknų ekstraktai padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje. Alfa liponinė rūgštis padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą, normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, normalią angliavandenių apykaitą. Rekomenduojama vartoti po 1 kapsulę per dieną.

CIKLIWELL FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildas su natūraliais izoflavonais (fitoestrogenais), skirtas moterims menopauzės metu. Kėkinės juodžolės šaknų ir raudonųjų dobilų žiedų ekstraktai padeda palaikyti limfinės sistemos veiklą ir normalią savijautą menopauzės periodu.

-20%



EVELOR, 50 mg, 90 kapsulių
EVELOR, H 200 mg, 30 tablečių

Maisto papildai*

Imunitetui, širdžiai ir kraujagyslėms, moterims menopauzės laikotarpiu. Resveratrolis – augalinis antioksidantas, apsaugantis ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo. EVELOR sudėtyje esantis resveratrolis yra išgautas iš didžiausią kiekį šios medžiagos kaupiančios Japoninės plačialapės rūgties (lot. Polygonum cuspidatum, kin. Hu Zhang) šaknų. Išgryninta mikronizuota (susmulkinta iki labai mažų dalelių) sudėtis. Kapsulę užgerti stikline vandens. 1 tabletėje EVELOR H yra 200 mg Trans resveratrolio. 1 kapsulėje EVELOR yra 50 mg Trans resveratrolio. Vartojimas: suaugusiems žmonėms gerti po 1 tabletę/kapsulę per parą, valgio metu.

OmegaPure Max, 60 minkštųjų kapsulių

Maisto papildai*

Koncentruoti žuvų taukai, turintys didelį kiekį – 1 250 mg žuvų taukų, kuriuose yra net 840 mg omega-3 riebiųjų rūgščių: EPA (eikozapentaeno) ir DHA (dokozaheksaeno) rūgščių. OmegaPure Max pagaminta iš atviroje jūroje sužvejotų ančiuvinių taukų. Gerkite po 1 kapsulę per dieną valgio metu.

-40%



„B COMPLEX“, kapsulės N40

Maisto papildas*

Įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinai, o normalią plaukų būklę – biotinas. Vitaminą protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis, kuria taip pat praturtinta šio preparato sudėtis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-40%



„**TRIPTAN FORTE**“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – Griffonia simplicifolia – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

-40%



Linija „**LIUBERIN**“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „**LIUBERIN superior**“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Ginkmedžio ekstraktas padeda palaikyti akies kraujotaką. O „**LIUBERIN + LUTEIN 35 MG**“ – preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg liuteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Mėlynių ekstraktas padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

-40%



„**RAMI ŠIRDIS**“ – gausios sudėties dviejų poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

„**RAMI ŠIRDIS CHOLESTEROLIO BALANSUI**“ sudėtyje esantis patentuotas ABG25+® juodojo česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Plunksnalapių gudobelų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Vaistinių valerijonų šaknų ekstraktas padeda atsipalaiduoti ir palaikyti normalią psichologinę būseną. Folių rūgštis, B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Sudėtis praturtinta berberinu.

Maisto papildas*

-40%



„**INOLAB**“ linija – sukurta Šveicarijoje, jai būdingas sinerginis sudedamųjų dalių poveikis.

„**INOLAB Atsparumas stresui**“ – tai 8 aktyviųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron®“ safrano ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, teigiamą nuotaiką ir padeda atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

„**INOLAB Stiprus magnis**“ – tai magnio, kurkumino ir piperino derinys aktyviam gyvenimo būdai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. „Cavacurmin®“ kurkuminas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę. Vartojimas: gerti po 1 paketėlį per dieną.

„**INOLAB Sirdžiai ir cholesterolio balansui**“ – tai 4 aktyviųjų medžiagų kompleksas jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. „ABG25+®“ juodųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-Te™“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildai*

-20%

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI,
NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI, ENERGIJAI

MAGVIT B complex, N20
MAGVIT Plus, N42
MAGVIT Platinum, N30
MAGVIT GO, N8


Maisto papildas*



„**Magvit Platinum**“ – greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletė magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per parą. „**Magvit Plus**“ skirtas raumenims, nervų sistemai ir širdžiai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, vitaminai B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Specialios ilgalaikio veikimo Depo formulės dėka, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą. „**Magvit B Complex**“ sudėtyje yra 400 mg magnio ir 8 B grupės vitaminai. Tinka vartoti fizinio krūvio metu. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 paketėlį per dieną. „**Magvit GO**“ – raumenims, nervų sistemai, energijai. „**Magvit GO**“ buteliukuose esantis magnis gaunamas iš organinės formos ir jau išsijęs, todėl organizmas lengviau jį pasisavina, palyginus su įprastomis tabletėmis. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis taip pat padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Naudojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 14 metų gerti 1 buteliuką per dieną.

1+1

GAMTOS ĮKVĖPTI
MINERALAI IŠ IZRAELIO!



ATLANT milteliai 15 g, N28

Maisto papildas*

Net 12 200 mg kolageno, 1500 mg gliukozamino, 120 mg kalcio ir 12 mg vitamino C kompleksas sąnariams, raumenims ir kaulams. Kolagenas – natūraliai žmogaus organizme sintetinamas baltymas. Šis baltymas yra odos bei sąnarių kremzlių ir kaulų sudedamoji dalis. Gliukozaminas yra sąnario kremzlės struktūrinė dalis. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių funkcijai, kaulų funkcijai ir odos funkcijai, susidarymą. Kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti. Produkto sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, stabilizatorių, kvapiųjų medžiagų. Pagaminta Izraelyje.

-30%



THEALOZ DUO akių gelis, 0,4 g

Medicinos priemonė

Be konservantų yra skirti apsaugoti, drėkinti ir sutepti akis vidutinio sunkumo ir sunkaus sausų akių sindromo gydymui. Gelis mažina dirginimą ir alergines reakcijas akyse, kurios gali pasireikšti po produktų, turinčių konservantų, panaudojimo. Tinka ašarų plėvelės disbalansui gerinti, pasireiškiančiam lėtinės sausų akių ligos metu.

THEALOZ DUO akių lašai, 10 ml

Medicinos priemonė

Vidutinio sunkumo ir sunkiam sausų akių sindromui gydyti. THEALOZ DUO yra sterilus, be konservantų ir su neutraliu pH hipotoninis tirpalas, kuris skirtas naudoti į akis ar ant kontaktinių lęšių. Apsaugo, drėkina ir lubrikuoja akis. THEALOZ DUO sudėtyje nėra konservantų, todėl akys jį puikiai toleruoja. Gali būti naudojami 6 mėnesius po atidarymo.

BLEPHACLEAN drėgnos servetėlės lęšiams ir vokams valyti, N20

Medicinos priemonė

BLEPHACLEAN skirtas kasdieninei akių vokų higienai, ypač jeigu Jūsų oda, akių vokai ar akys yra jautrios ar jeigu Jums reikia pašalinti dulkes, žiedadulkes ir išskyras nuo akių vokų, esant alergijai ar infekcijai Jūsų akyse.

-20%



Maisto papildai*

RED3 STIPRESNIS, 60 kapsulių

Pagrindą sudaro trys kliniškai patvirtintos unikalių medžiagų, kurių poveikį sustiprina ir kiti žoliniai ekstraktai, menantys tūkstantmetę tradiciją rūpinantis vyrų sveikata. Visos sudedamosios dalys, taikant ypatingą ir maksimaliai tikslią šveicarišką technologiją, telpa vienoje kapsulėje. Sudėtyje esančios afrikinės slyvos padeda palaikyti prostatos būklę. Peruvinės pipirės ir juodieji eleuterokokai padeda palaikyti normalią vyrų fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Pagaminta Šveicarijoje. Pakanka tik 1 kapsulės per dieną. Pakuotės užtenka 2 mėnesių kursui.

CEMIO GEMZĖ 2x STIPRESNIS, 60 kapsulių

Sudėtyje yra naujos kartos kolagenai NCI® ir NCII®. Taikant ypatingas apdorojimo technologijas, kolagenas NATIV.COL™ išlaiko pirmą trigubos spirалės struktūrą ir savo biologinį aktyvumą. I tipo kolagenas sudaro iki 90 % visų kolagenų randamų kūne. II tipo kolagenas sudaro iki 70 % sausos kremzlės masės. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlių funkcijai, susidarymą.

MUSTANG MAXX POWER, 30 tablečių

Ištin stipri formulė, kurios sudėtyje yra grynos formos kolageno NCI® ir NCII®, gliukozamino, avokadų, sojų ir svarbių mikroelementų, vienoje greitai įsisavinamoje tabletėje kasdienai. Suaugusiems 1 tabletė per dieną.

-30%

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PATIKIMOSE RANKOSE



LEUKOPLAST®

Medicinos priemonės

Aukštos kokybės pleistrai, skirti nedidelėms žaizdoms, tokioms kaip įpjovimai, įbrėžimai, nubrozdinimai ar įtrūkimai. Yra įvairių tipų pleistrų: sterilūs, atsparūs vandeniui ar apsaugantys nuo bakterijų patekimo į žaizdą, itin tvirtai prilimpantys ar švelnūs odai. „Leukoplast elastomull haft“ – kibus elastinis bintas tvarsčių prilaikymui ir fiksavimui. Unikalus tuo, kad limpa pats prie savęs, tačiau nelimpa prie odos. Išsirinkite tinkamiausias priemones savo pirmosios pagalbos vaistinėi.

OCTEZY, 1 mg/20 mg/g odos purškalas, tirpalas 50 ml

6⁹³ €

OCTEZY, 1 mg/20 mg/g odos purškalas, tirpalas 100 ml

9⁵⁸ €



Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklosios medžiagos stiprumas. Kiekviename g tirpalo yra 1 mg oktenidino dihidrochlorido ir 20 mg fenoksietanolio. Terapinės indikacijos. Visų amžiaus grupių pacientų kartotinis trumpalaikis pagalbinis mažų, paviršinių žaizdų antiseptinis gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams Octezy vartojamas ant gydomos srities, kol ji bus visiškai sudrėkinta. Pavartojus šį vaistinį preparatą ir prieš imantis kitų priemonių, pvz., uždedant ant žaizdos tvarstį, reikia palaukti mažiausiai 1–2 minutes. Octezy turi būti vartojamas ne daugiau kaip 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 6 metų vaikams vartojimą reikia riboti iki kelių dienų. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Octezy negalima nuryti, vartoti didesniais kiekiais nei būtina. Siekiant išvengti audinių pažeidimo, reikia būti atsargiems plauçant žaizdą ir užtikrinti, kad vaistinis preparatas nebūtų naudojamas su slėgiu ar suleidžiamas į audinius. Esant žaizdai su ertmėmis, reikia užtikrinti, kad bet kuriuo metu būtų užtikrintas vaistinio preparato išleidimas. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Octezy draudžiama vartoti pilvo ertmės, šlapimo pūslės ar ausies būgnelio plovimui. Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>. Reklamos teksto parengimo data 2025 06.

-40%



Green Feel's veido ir kūno priežiūros produktų asortimente gausu tiek universalių, tiek išskirtinai kiekvienam odos tipui pritaikytų priemonių, kurių veiksmingumas patikrintas moksliniais tyrimais. Atrask ir suspindėk!

iki -20%

NEPRIEKAIŠTINGAI SLAUGAI IR HIGIENAI



Sauskelnės, įklotai, paklotai ir odos priežiūros priemonės – tai būtinos priemonės šlapimo nelaikymui kontroliuoti. „TENA“ sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria ir sulauko šlapimą viduje, todėl paviršius išlieka sausas ir nedirgina odos. Kvapo neutralizavimo sistema efektyviai apsaugo nuo nemalonaus kvapo atsiradimo. „TENA“ odos priežiūros priemonės švelniai valo ir drėkina net gležną, sausą ir pažeidžiamą odą. Patikrinta dermatologų.

**Prašome į dėmias perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoji, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

VAISTINIŲ KONTAKTAI

 VILNIUS Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642 Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520	 GIRKALNIS Šėtupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523 Raseinių raj.
 KAUNAS V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826	 GRINKIŠKIS Tilto g. 13-2, tel. (0 422) 63 388 Radviškių raj.
 MASTAIČIAI Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144 Kauno raj.	 GRĮŠKABŪDIS Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266 Šakių raj.
 KLAIPĖDA Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914	 JONIŠKĖLIS Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219 Pasvalio raj.
 ŠIAULIAI Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879	 KAIŠIADORYS Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745
 ALYTUS Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088	 KRUONIS Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106 Kaišiadorių raj.
 BUTRIMONYS Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244 Alytaus raj.	 SASNAVA Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511 Marijampolės raj.
 MIROSLAVO K. Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587 Alytaus raj.	 SEIRIJAI Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939 Lazdijų raj.
 DRUSKININKAI Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008	 ŠAKIAI V. Kudirkos g. 48, tel. (0 345) 51 516
 ELEKTRĖNAI Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415	 VENTA Žemaičių g. 31-43, tel. (0 425) 30 447
 ABROMIŠKIŲ K. Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310 Elektrėnų sav.	

Užsisakykite prekes internetu www.100metu.lt ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!



VAISTINĖS - PARTNERĖS

BALBIERIŠKIS

Prienų raj.

„Guobos vaistinė“
Sanatorijos g. 72
tel. (0 528) 27 310

KALVARIJA

Marijampolės raj.

„Kalvarijos vaistinė“
Ugniagesių g. 9
tel. (0 343) 21 257

KĖDAINIAI

„Kaštonų vaistinė“
J. Basanavičiaus g. 10
tel. (0 347) 67 244

KURŠĖNAI


„Kuršėnų vaistinė“
Vytauto g. 5
tel. (0 415) 85 747

MARIJAMPOLĖ

„Gubijos vaistinė“
R. Juknevičiaus g. 72-1
tel. (0 343) 97 372

-25%

ARGO AKIS



AKINIAI SKAITYmui, kurių rėmelių dizainas patiks net ir išrankiausiems naudotojams.

-30%

Taikoma visam Ziaja asortimentui

ziaja
Focus
on skin



ZIAJA - aukštos kokybės veido, kūno ir plaukų priežiūros kosmetika, pagrįsta veiksmingais ingredientais.

- Natūrali kilmė
- Aukštos kokybės receptūra
- Kainos ir kokybės santykis

-30%

Taikoma visam Aromatika asortimentui

AROMATIKA



AROMATIKA - natūralios kosmetikos priemonės Jums ir Jūsų šeimai!