SAUSIO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2026 01 01 - 2026 01 31

Ramunėlės vaistinė

Gyvensenos medicinos specialistas
Vytautas Vasiliauskas
mob. +370 698 49092

KAS GALI PADĖTI IŠVENGTI GRIPO?

Turbūt niekam ne paslaptis, kad gripą sukelia virusai ir kad jie plinta oru. Kodėl gripas dažniau plinta orams atšalus? Todėl, kad šie virusai „mėgsta“ sausą ir vėsų orą – tokiomis sąlygomis jie lengvai sklinda ir tarsi „plūduriuoja“ore. Tinkamiausia temperatūra gripo virusams yra apie 5 °C ar šiek tiek mažesnė. Dėl šios priežasties gripu dažniausiai susergama rudenį ir pavasarį.

Kambario temperatūroje ir esant didesnei drėgmei gripo virusai praktiškai neplinta, nes drėgmė, kaip ir lietus, savotiškai išplauna orą. Drėgname ore virusai susijungia su vandens lašeliais, tampa sunkūs ir nusėda žemyn. O stiprus šaltis gripo virusus sunaikina.

Užsikrečiama nuo gripu sergančio žmogaus oro lašeliniu būdu (įkvėpiant užkrėsto oro) arba per neplautas rankas, kuriomis paliečiama akių, nosies ar burnos gleivinė. Pavyzdžiui, kažkas nusišluostė varvančią nosį, vėliau palietė durų rankeną ar paspaudė ranką kitam, dar sveikam žmogui. Taip virusai akimirksniu patenka ant kito žmogaus rankų.
Gripo infekcija plinta itin greitai. Pavojinga ne tiek pati liga, kiek jos sukeliamos komplikacijos, kurios gali pažeisti beveik visas organizmo sistemas. Didžiausia rizika susirgti sunkia gripo forma tenka patiems mažiausiems vaikams (iki 2 m.) ir vyresnio amžiaus žmonėms (virš 65 m.), nes mažylių imunitetas dar nėra visiškai susiformavęs, o pagyvenusių žmonių imunitetas dažnai nusilpęs dėl lėtinių ligų.

>>>

1+1

PAPILDYK SAVO ORGANIZMĄ MINERALAIS IR VITAMINAIS!

Maisto papildai milteliais. Gamyboje nenaudojami jokie konservantai, stabilizatoriai, dažikliai ar emulsikliai. Išsirinkite jums reikalingiausius maisto papildus: imuninės sistemos veiklai, geram miegui, elektrolitų balansui atstatyti, smegenų veiklai ir atminčiai. Magnis nuovargiui mažinti, energijai, raumenims, nervų sistemai, cinkas imunitetui, stipriems nagams ir plaukams, kalcis kaulams, kolagenas sąnariams bei grožiui. Magnis išgaunamas iš Negyvosios jūros. Dauguma mineralų – citratų formos, tai organizmo lengvai pasisavinama ir gerai toleruojama forma. Pagaminta Izraelyje.

*Maisto papildai**

Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt

Pasiūlymai galioja 2026 m. sausio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą.
Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

Kas gali padėti apsisaugoti nuo gripo?
● Dažna rankų higiena: plauti rankas su muilu bent 10 kartų per dieną, ypač po kontakto su galimai užkrėstais paviršiais.
● Reguliarus patalpų drėkinimas ir vėdinimas, esant galimybei – oro jonizavimas. Rekomenduojama palaikyti optimalią kambario temperatūrą (apie 18 °C) ir drėgmę (30–50 %), dažnai atlikti patalpų valymą.
● Grūdinimasis ir dažnas buvimas gryname ore.
● Pakankamas poilsis ir miegas.
● Peršalimo vengimas: ypač svarbu, kad kojos ir rankos visuomet būtų šiltos.
● Nosies gleivinės apsauga: prieš einant į lauką nosies landas patepti augaliniu aliejumi; šiek tiek aliejaus galima nuryti, kad sudrėkintų gerklę. Tai sumažina gleivinių pažeidimo riziką.
● Reguliarus nosies plovimas virintu vandeniu arba 1 % druskos tirpalu (dar geriau – jonizuotu rūgštiniu vandeniu).
● Grįžus namo, skalauti gerklę ramunėlių nuoviru, propolio tirpalu arba lengvai pasūdytu vandeniu (taip pat tinka jonizuotas rūgštinis vanduo).
● Visavertė mityba stiprina imuninės sistemos veiklą. Ypač naudingi: avižos, bičių produktai (duonelė, žiedadulkės, medus), česnakas (rekomenduojama kasdien sukramtyti po skiltelę), imbieras, mielės, prieskoniai (cinamonas, garstyčios, gvazdikėliai, krienai, lauro lapai ir kt.), ridikai, salierai, svogūnai.
● Tinkamas skysčių kiekis: per dieną išgerti 6–8 stiklines skysčių. Profilaktiškai ir susirgus tinka šiltos aviečių, islandinės kerpenos, liepžiedžių, medetkų, ramunėlių, saldymedžio, šalavijo, šeivamedžio arbatos, natūralios sultys, imunitetą stiprinantis sidabringas vanduo.
● Geros emocijos: juokas, šypsena, dainavimas, optimizmas teigiamai veikia imuninę sistemą.
● Vitaminai ir maisto papildai. Moksliniai tyrimai rodo, kad imuniteto veiklai svarbu, jog organizmui netrūktų vitaminų, mineralų, antioksidantų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų. Rekomenduojama naudoti polivitaminų ir multimineralų kompleksus, vitaminą C, cinką, rutozidą, žuvų taukus (vitaminų A, D ir Omega-3 šaltinis), probiotikus ir prebiotikus.

Kaip sumažinti gripo platinimą, jei jau susirgote?
Jei iš nosies bėga sekretas, naudokite vienkartines nosines arba dažnai keičiamas medžiagines nosinaites.
Čiaudint ar kosint visada prisidengti burną ir nusisukti nuo kitų žmonių (gripo virusas plinta kartu su seilių lašeliais). Po to būtina nusiplauti ir dezinfekuoti rankas.
Susirgus vengti viešumos, daugiau ilsėtis ir gulėti.

Būkite sveiki, žvalūs, energingi ir aktyvūs!
Prisiminkite – ligos lengviau išvengti, nei ją gydyti. Natūralias priemones verta pradėti taikyti vos pajutus pirmuosius gripo ar peršalimo simptomus. Susirgus nedelsdami keipkitės į savo šeimos gydytojus.

1 83 €

EFEKTYVIAI MALŠINA SKAUSMĄ IR MAŽINA TEMPERATŪRĄ

IBUSTAR 400 mg plėvele dengtos tabletės, N10

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Indikacijos: Simptominis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo gydymas. Simptominis karščiavimo gydymas. Suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12 metų vienkartinė dozė yra ½–1 tabletė per parą. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg (3 Ibustar plėvele dengtos tabletės). Vaikams Ibustar vienkartinė dozė 20 kg–29 kg (6-9 metai) ir 30 kg–39 kg (10 -11 metų) yra ½ tabletės. Didžiausia paros dozė 20-29 kg - 1½ ir 30-39 kg - 2 tabletės. Vienkartinės dozės geriamos ne dažniau nei kas 6 valandos. Kontraindikacijos. Ibustar vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums, pavartojus acetilsalicilo rūgšties turinčių vaistų arba kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, yra buvę alerginių reakcijų, tokių kaip astmos priepuoliai; nosies gleivinės paburkimas; odos reakcijos; jeigu yra nežinomos kilmės kraujodaros sutrikimų; jeigu Jums yra aktyvi arba pasikartojanti skrandžio arba plonosios (dvylikapirštės) žarnos opa arba kraujavimas; jeigu Jums yra buvęs su ankstesniu NVNU gydymu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo perforacija;jeigu Jums yra galvos smegenų kraujagyslių arba kitoks aktyvus kraujavimas ;jeigu Jums yra sunkus kepenų arba sunkus inkstų nepakankamumas; jeigu Jums yra sunkus širdies nepakankamumas;-jeigu Jums yra paskutiniai trys nėštumo mėnesiai; vaikams, kurių svoris yra mažesnis nei 20 kg (jaunesniems nei 6 metai). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jei vartojant Ibustar pasireiškia kraujavimas iš virškinimo trakto arba opėjimas, vaisto vartojimą būtina nutraukti. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju.Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT_Ibu_05_2024_V1_print Reklama paruošta 2024 m. rugsėjo mėn.
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

KARŠČIAVIMO MAŽINIMUI IR SKAUSMO MALŠINIMUI

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams 100ml **4 35 €**

IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. 100ml **7 29 €**

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiesiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtykite. Ibustar vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praeityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neaiškių kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praeityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikui atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks nejprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gal slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėjaraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT_Ibu_01_2024_V1_print UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

Pasiūlymai galioja 2026 m. sausio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

FLAVAMED 30 mg tabletės N20 4 05 €

FLAVAMED 60 mg šnypščiosios tabletės N10 5 26 €

FLAVAMED 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas 100 ml 4 26 €

FLAVAMED 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas 100 ml 4 49 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletes reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigerti pakankamu skysčio kiekiu. Suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą. 6-12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2 -3 kartus per parą, 2-5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4 - 5 dienas Flavamed vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30 mg tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. Flavamed 60 mg šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai. Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; esant histamino netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed, jeigu jums praeityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Flavamed 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamajame tirpale bei šnypščiosiose tabletėse yra sorbitolio bei benzenkarboksirūgšties. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurius laisvinantį poveikį Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas įgimtas fruktozės netoleravimas prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytojui. Flavamed šnypščiojoje tabletėje yra benzilo alkoholio, kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač nėščioms ar žindančioms moterims,asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos.
UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com LT-FLA-7-2025_MFLOW, 2025/12

9 49 €

UMCKALOR® geriamieji lašai (tirpalas), 20 ml
UMCKALOR® 20 mg, 15 plėvele dengtų tablečių

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Lašai. 1 g (= 0,975 ml) tirpalo yra 800 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto (1:8-10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11 % (m/m) etanolis. Tabletės. 1 plėvele dengtoje tabletėje yra 20 mg Pelargonium sidoides DC., radix (pelargonijų šaknų) skystojo ekstrakto, džiovinto (1 : 8 - 10). Ekstrakcijos tirpiklis: 11% (m/m) etanolis. Indikacijos: Umckalor yra augalinis vaistas, skirtas ūminio bronchito simptomams mažinti, atsikosėjimui lengvinti. Vartojimo būdas ir dozavimas. Lašai. Jei gydytojas nepaskyrė kitaip, įprasta dozė yra: a) suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams gerti po 30 lašų 3 kartus per dieną, b) vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus gerti po 20 lašų 3 kartus per dieną, c) mažiems vaikams nuo 1 iki 5 metų gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Lašus gerti su nedideliu vandens kiekiu ryte, dieną ir vakare. Tabletės. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus paaugliams vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Vartoti nekramtant, užgeriant nedideliu kiekiu vandens. Kontraindikacijos. Alergija Pelargonium sidoides ekstraktui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. (Papildomai lašams) jeigu sergate sunkiomis kepenų ligomis, kadangi nėra pakankamai patirties. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Umckalor: jeigu turite bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimų. Jeigu Jūsų būklė nepagerėja per 7 dienas, temperatūra laikosi kelias dienas, pasireiškia bet kokio pobūdžio kepenų veiklos sutrikimas, vargina dusulys arba atkostite skreplių su krauju, kreipkitės į gydytoją. (Papildomai tabletėms) Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

ATSIKOSĖK LENGVIAU SU HALIXOL!

2 91 €

4 29 €

HALIXOL® 30 mg tabletės, N20
HALIXOL® 15 mg/5 ml sirupas

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Nuo kosulio ir peršalimo.

Veikliosios medžiagos stiprumas. Kiekviename ml sirupo yra 3 mg, tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis obstrukcinėmis kvėpavimo takų ligomis, pvz., bronchų astma, bronchitu, bronchektazija, kurių metu atsiranda patologiškai tirštų gleivių ir skreplių. Dozavimas ir vartojimo metodas. Sirupas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams reikia vartoti po 10 ml sirupo 3 kartus; 6–12 metų vaikams dozė yra 5 ml 2–3 kartus per parą; 2–5 metų vaikams dozė yra 2,5 ml 3 kartus per parą; jaunesniems kaip 2 metų vaikams-2,5 ml 2 kartus per parą. Tabletės: Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per parą. Rekomenduojama dozė 6 – 12 metų vaikams yra ½ tabletės 2–3 kartus per parą. Vaikams jaunesniems nei 6 metai nerekomenduojama. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vartojant Halixol reikia atsižvelgti į padidėjusio jautrumo reakcijas. Jei yra progresuojančio odos išbėrimo (kartais susijusio su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais) simptomų ar požymių, reikia nedelsiant nutraukti gydymą. Jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, yra inkstų ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas. Tablečių sudėtyje yra laktozės. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.Virškinimo trakto opinės ligos. Pirmaisiais trimis nėštumo mėnesiais sirupo vartoti nerekomenduojama. Registruotojas. Egis Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38 Vengrija.Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt. Reklamos teksto parengimo data 2025 05.

4 05 €

PERTUSINAS Forte, 100 ml

PERTUSINAS, 100 ml 3 65 €

PERTUSINAS vaikams, 100 ml 4 87 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai, kurių indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Vaistiniai preparatai vartojami peršalus, kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. „Pertusinas“. Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 162,5 mg Thymus vulgaris L ir/ar Thymus zygis L, herba(čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas: 30% (V/V) etanolis. Pagalbinės medžiagos: 1 ml. tirpalo yra 1025 mg sacharozės ir 62,5 mg 80 % etanolio. Dozavimas ir vartojimas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 1 desertinį šaukštą (10 ml). „PERTUSINAS forte“. Sudėtis: 1 ml tirpalo yra 307,5 mg Thymus vulgaris L. ir ar. Thymus zygis L., herba (čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:1). Ekstrahentas: 30% (V/V) etanolis. Pagalbinės medžiagos: 1 ml. tirpalo yra 919 mg. Sacharozės. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 m. paaugliams gerti 3–5 kartus per parą po 1 arbatinį šaukštelį (5 ml). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas čiobreliams ar kitiems notrelinių (lūpažiedžių) šeimos (Lamiaceae, s. Labiatae) augalams. Specialūs įspėjimai: nerekomenduojama vartoti jaunesniems nei 12 m. vaikams, nes trūksta tyrimų duomenų. Jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingų skreplių, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Teksto parengimo data: 2019-01-23. PERTUSINAS sirupas, vaikams. Sudėtis: 1 ml sirupo yra 0,2 ml Thymus vulgaris L. ir (arba) Thymus zygis L., herba (vaistinių čiobrelių žolės) skystojo ekstrakto (1:2). Ekstrakcijos tirpiklis: 10 % (m/m) amoniako tirpalas / 85 % glicerolis / 90 % (V/V) etanolis / vanduo (1/20/70/109). Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas peršalus, kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. Skirtas 4 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams. Vartojimas. Vyresniems kaip 12 metų paaugliams: gerti po 10 ml sirupo (2 matavimo šaukštus) 3 kartus per dieną. 4-12 metų vaikams ir paaugliams: gerti po 5 ml sirupo (1 matavimo šaukštą) 3 kartus per dieną. Specialūs įspėjimai. Jei atsiranda dusulys, karščiavimas ar pūlingi skrepliai, būtina pasitarti su gydytoju. Jei vartojant šio vaisto simptomai neišnyksta per savaitę, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 4 metų kūdikiams ir vaikams, nes tokio amžiaus kūdikius ir vaikus turi konsultuoti gydytojas. Šio vaisto sudėtyje yra nuo 4 iki 6 % (V/V) etanolio (alkoholio). Reklamos teksto parengimo data: 2019-08-01.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

-25%

DR. MÜLLER - maisto papildai* normaliai kvėpavimo sistemos, gerklės, ryklės, bei balso stygų funkcijoms palaikyti.

8 10 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA

SEPTABENE, 3 mg/1 mg, kietosios pastilės N16

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Eukaliptų skonio / Citrinų ir šeivamedžio skonio / Citrinų ir medaus skonio / Kolos skonio

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido. Terapinės indikacijos: „Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę, lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu) ir ryklės uždegimu (faringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji: rekomenduojama paros dozė yra 3–4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val.; 6–12 m. vaikai: rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3–6 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2024-02-27.

9 49 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA

SEPTABENE 1,5 mg/5 mg/1 ml burnos gleivinės purškalas 30 ml

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius - skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą.
Septabene vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti:
- jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas;
- sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu);
- prieš dantų traukimą ir po jo.

Dozavimas suaugusiesiems. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. 6-12 metų vaikams. Vienkartinė dozė yra suvartojama purkštuvo galvutę paspaudus vieną kartą. Tokią dozę kartotinai galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. Kontraindikacijos ir specialieji perspėjimai. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Septabene negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydomojo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Septabene negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkvėpti. Teksto peržiūros data: 2023 08 09.

5 27 €

ATKEMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĖJUSIĄ NOSIES GLEIVINĘ

SEPTANAZAL 1 mg/50 mg/ml nosies purškalas (suaugusiems)

SEPTANAZAL 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalas (vaikams)

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:
- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
- nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
- kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.

Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Septanazal suaugusiesiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspantenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda šašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegininė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Specialūs įspėjimai. Septanazal galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinti galinčiais vaistiniais preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždaro kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija.

HERBION 35 mg kietosios pastilės 6 57 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 35 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5:1).Terapinės indikacijos: Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiesiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Dozavimas ir vartojimo būdas: Įprasta dozė 6-11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiesiems, senyviems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Vartoti ant burnos gleivinės. Leisti pastilei lėtai ištirpti burnoje. Jei simptomai išlieka šio vaistinio preparato vartojant ilgiau kaip savaitę, pacientui būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems gebenių šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai: Jei pasireiškia dispnėja (dusulys), karščiavimas arba atkosima pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistinių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas, nerekomenduojama. Gastritu ar skrandžio opalige sergantiems ligoniams vaistinio preparato rekomenduojama vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 12 07.

HERBION 7 mg/ml sirupas 6 85 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

1 ml sirupo yra 7 mg Hederae helicis L., folii (gebenių lapų) sausojo ekstrakto (5–7,5:1). Herbion yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikosėjimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui. Suaugę žmonės, senyvi, 12 metų paaugliai ir vyresni. Du kartus per parą gerti 57,5 ml sirupo (atitinka 70105 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto paros dozę). 6-12 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 70 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto paros dozę). 2-5 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 2,5 ml sirupo (atitinka 35 mg gebenių lapų sausojo ekstrakto paros dozę). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems Araliaceae (gebenių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. 24 metų vaikų nuolatinį ar pasikartojantį kosulį galima pradėti gydyti tik nustačius medicininę diagnozę. Jei pasireiškia dispnėja, karščiavimas arba atkosima pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydymo Herbion metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių preparatų, tokių kaip kodeinas ar dekstrometorfanas, nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-21.

-30%

SAUSAM, DIRGINANČIAM KOSULIUI

HERBISLAND 6 mg/ml sirupas

Medicinos priemonė

Herbisland sirupo sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto.

Herbisland rekomenduojamas vartoti pasireiškus:
- sausam, dirginančiam kosuliui;
- užkimimui;
- gerklės skausmui.

Herbisland sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę.

Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus.
Be cukraus (į sudėtį jeina natūralios kilmės sorbitolis)
Malonaus citrinų skonio.

Kaip vartoti Herbisland?
1-4 metų vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) X 4 k./d.
4-10 metų vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) X 4 k./d.
10-16 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) X 4 k./d.
16 metų ir vyresniems – 15 ml (3 matavimo šaukštai) X 4 k./d.
Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą.

Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.

Pasiūlymai galioja 2026 m. sausio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tab. 2 50 €

APAP express, 500 mg, 10 minkštųjų kapsulių 3 26 €

APAP, 250 mg, granulės paketėlyje, vaikams, 10 pak. 6 29 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 plėvele dengtoje tabletėje „APAP, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. 1 minkštojoje kapsulėje „APAP express, 500 mg" yra 500 mg paracetamolio. 1 paketėlyje „APAP 250 mg „ vaikams" yra 250 mg paracetamolio. Indikacijos: simptominio lengvo ar vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Apap express, 500 mg" minkštosios kapsulės: suaugusiesiems ir paaugliams, sveriantiems daugiau kaip 55 kg (nuo maždaug 15 metų) 1–2 minkštosios kapsulės (500–1 000 mg) vienu metu, ne daugiau kaip 6 kapsulės (didžiausia paros dozė– 3 000 mg) kas 24 valandas. „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg, vaikms" granulių paketėliuose vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 m. vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandas (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas paracetamoliui, žemės riešutams ar sojai, arba bet kuriai vaisto sudėtyje esančiai pagalbinei medžiagai. Sunkus inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai. Prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku, jeigu: yra inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka; piktnaudžiaujantiems alkoholiu; dehidratuotiems arba nuolat blogai besimaitinantiems; sergantiems astma; vartojami kai kurie kiti vaistai; nėštumo ir žindymo laikotarpiu; yra hemolizinė anemija. Gydantis šiais vaistiniais preparatais alkoholio vartoti negalima. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data: 2025-03-31.

8 56 € RENKUOSI „IBUPROM". RENKUOSI LAISVĘ.

IBUPROM, 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprom" 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprom" skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praeityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo traktą ar kitoks kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs įspėjimai: senyviems pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiesiems diabetu, sistemine raudonąja vilklige, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirino apykaitos sutrikimas, dehidratacija, vartojantiesiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2024-07-03.

NUMALŠINA SKAUSMĄ NET IKI 12 VAL.!

3 87 €

NALGESIN S 275 mg, 10 plėvele dengtų tablečių

NALGESIN S 275 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 5 40 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Skirtas galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti.Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 275mg natrio naprokseno.Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1-2 tab., vėliau – po 1 tab. kas 8-12 val. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų Nalgesin S plėvele dengtų tablečių vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydomą pacientą, sergantį epilepsija ar porfirija, kuriam buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naprokseno draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. Reklamos teksto parengimo data: 2024 09 18

8 76 € „INOVOX". EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS

INOVOX MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidrochlorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklės skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklės ir burnos ertmės uždeginiųjų būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūmine liga sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklės žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

6 96 €

TONUFEN 200 mg/30 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Tonufen" dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Indikacijos: trumpalaikiam simptominiam nosies ir ančių užsikimšimo, susijusio su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinusitu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 1 arba 2 tabletės per burną kas 4 valandas. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinėms medžiagoms, praeityje pasireiškusios alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinamojo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertireoze, cukriniu diabetu, užduro kampo glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. Specialūs įspėjimai: atsargiau reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praeityje sirgusiems astma ar alergine liga, sergant raudonąja vilklige, sirgusiems virškinamojo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviems pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data: 2025-09-17.

12 73 €

DIFORTAN, 100 mg/g, gelis, 100 g

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „Difortan" gelio grame yra 100 mg etofenamato. Terapinės indikacijos: lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrozės / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminės ar reumatinės kilmės, lokalus gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išspausto gelio. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. Specialūs įspėjimai: „Difortan" negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais uždegimus malšinančiais vaistiniais preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atmesti sisteminio poveikio reiškinių galimybės, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-19.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

-20%

EFEKTYVIAI MAŽINA HEMOROJAUS SIMPTOMUS

REPAHERB tiesiosios žarnos žvakutės N10
REPAHERB tepalas 25 g

Repaherb tiesiosios žarnos tepalas ir žvakutės skirtos su hemorojumi ir jo komplikacijomis susijusiems simptomams (pvz., egzemai, išangės įtrūkiams) lengvinti. Jis padengia ir apsaugo epidermį, sumažina odos uždegimą bei niežulį ir taip padeda skatinti odos regeneraciją. Jis sumažina odos džiūvimą, todėl padeda žaizdų gijimui bei sumažina tuštinimosi sukeltų įtrūkių ir pažeidimų atsiradimo riziką. Kaip veikia sukralfatas? Sukralfatas yra veikliojі medžiaga, naudojama gleivinei apsaugoti ir gleivinės bei odos pažeidimams gydyti. Sukralfatas suformuoja apsauginę plėvelę, kuri padengia mikro įtrūkimus ir plyšimus, taip sukeldamas uždegimą mažinantį bei antibakterinį poveikį. Ši veikliojі mediaga ne tik gydo gleivinės bei odos pažeidimus, bet ir skatina kraujagyslių regeneraciją ir epitelio formavimąsi. Tiesiosios žarnos tepalą ar žvakutes galima naudoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu

7 37 €

DEEP RELIEF 50 mg/30 mg/g gelis, 50 g

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Terapinės indikacijos: Lokalūs sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumos (pvz., patempimo, išnirimo) sukelto skausmo malšinimas. Dozavimas: Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gelio iš 50 g tūbelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm, iš 50 g tūbelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Nevirškyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkias dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masažuoti, kol susigers. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantiems pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinita ar dilgėlinę. Nubrodzinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutinės nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Deep Relief“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinių ir akių. Netinka tepti po sandarinamuoju tvarsčiai. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registruotojas ir gamintojas: The Mentholatum Company (Ireland) Limited, Airija.

-20%

*Maisto papildai**

RED3 STIPRESNIS, 60 kapsulių

Pagrindą sudaro trys kliniškai patvirtintos unikalios medžiagos, kurių poveikį sustiprina ir kiti žoliniai ekstraktai, menantys tūkstantmetę tradiciją rūpinantis vyrų sveikata. Visos sudedamosios dalys, taikant ypatingą ir maksimaliai tikslią šveicarišką technologiją, telpa vienoje kapsulėje. Sudėtyje esančios afrikinės slyvos padeda palaikyti prostatos būklę. Peruvinės pipirnės ir juodieji eleuterokokai padeda palaikyti normalią vyrų fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Pagaminta Šveicarijoje. Pakanka tik 1 kapsulės per dieną. Pakuotės užtenka 2 mėnesių kursui.

CEMIO GEMZĖ 2x STIPRESNIS, 60 kapsulių

Sudėtyje yra naujos kartos kolagenai NCI® ir NCII® . Taikant ypatingas apdorojimo technologijas, kolagenas NATIV.COL™ išlaiko pirminę trigubos spiralės struktūrą ir savo biologinį aktyvumą. I tipo kolagenas sudaro iki 90 % visų kolagenų randamų kūne. II tipo kolagenas sudaro iki 70 % sausos kremzlės masės. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų, kremzlių funkcijai, susidarymą.

MUSTANG MAXX POWER, 30 tablečių

Itin stipri formulė, kurios sudėtyje yra grynos formos kolageno NCI® ir NCII®, gliukozamino, avokadų, sojų ir svarbių mikroelementų, vienoje greitai įsisavinamoje tabletėje kasdienai. Suaugusiesiems 1 tabletė per dieną.

-40%

celluLESS, 60 kapsulių

*Maisto papildas**

Paragvajinių bugienių lapų ekstrakto, L-karnitino ir konjuguotos linolo rūgšties derinys nukreiptas į pagrindines celiulito susidarymo priežastis. Paragvajinių bugienių lapų ekstraktas padeda palaikyti normalų kūno svorį ir normalią riebalų apykaitą .

migraLESS, 60 kapsulių

*Maisto papildas**

Skirtas susiduriantiems su migrena. Vaistinių skaistenių žiedų ekstraktas padeda atsipalaiduoti. Grifonijų sėklų milteliai padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Magnis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.

iki-50%

ISKIAL MAX, 120 kapsulių
ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių

*Maisto papildai**

„ISKIAL“ – ryklio kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklio kepenų aliejus – tai vienas turtingiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „ISKIAL JUNIOR“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, kurios svarbios normaliai smegenų funkcijai ir padeda išsaugoti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „ISKIAL MAX“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

-40%

*Maisto papildai**

VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių
VITAMIN C PROLONG 1000 mg, 14 paketėlių

„Vitamin C prolong“ kapsulės ir „Vitamin C prolong 1000“ miško uogų skonio milteliai, kuriuose yra ir prailginto veikimo patentuoto vitamino Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

RUTIN FORTE+C, 30 kapsulių

„Rutin forte+C“ – silpnoms kraujagyslėms. Sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C.

Pasiūlymai galioja 2026 m. sausio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

*Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

10 02 €

LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N30

LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N60

17 25 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

UŽGESINA RĖMENĮ ILGAM!

3 78 €

NOLPAZA 20 MG, 7 skrandyje neirios tabletės

NOLPAZA 20 MG, 14 skrandyje neirių tablečių

5 73 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos. Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tabletė). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutraukiamas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. Nolpaza nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Nolpaza 20 mg skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartus su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviro, nelfinaviro, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardytais atvejais jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfagija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę; yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama neviršikinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvę simptomai pasikeitė. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmuo išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Nolpaza tabletėse yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data. 2024-09-17

2 06 €

Į ŠIRDĮ IMKITE TIK GERUS DALYKUS

ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

*Tradicinis augalinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra, gudobelių vaisių skystasis ekstraktas. Indikacijos: tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. Pirmąsias tris arba keturias dienas reikia gerti po 20–30 lašų 3–4 kartus per dieną, vėliau dozę sumažinti ir gerti po 15–20 lašų 2–3 kartus per dieną. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. Specialūs įspėjimai: vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant vaisto širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. Reklamos teksto parengimo data: 2018-08-30.

-40%

„MAGNIS + B6 COMPLEX“ sudėtyje magnis yra magnio oksido pavidalu. O **„MAGNIS + B6 SUPERIOR“** naudojama ypatinga magnio forma – dvi magnio druskos (magnio oksidas ir magnio citratas), kurios organizme išlieka ilgiau, nes suyra skirtingu metu. Abiejų preparatų sudėtis papildyta ir vitaminu B6. Magnis ir vitaminas B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, todėl ypač tinka aktyviai sportuojantiems.

„B TOTAL + MAGNE“ tai įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys praturtintas magniu, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją bei normalią raumenų funkciją ir padeda mažinti nuovargį.

*Maisto papildai**

-25%

FERMENTIZYN Forte kapsulės N15
GASTRO kapsulės N30
HEPATRIN Forte kapsulės N30

Normaliai virškinimo sistemos, žarnyno bei kepenų veiklai palaikyti.

DETOX EFFEX skystis 500 ml

Daržovinių artišokų lapų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą, bei žarnyno būklę, padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų, padeda palaikyti normalų lipidų kiekį kraujyje,normalų kūno svorį, normalią šlapimo sistemos funkciją, padeda palaikyti vandens šalinimo perinkstus funkciją, padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą. Tikrųjų margainių sėklųekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vartojimas: Suaugusiems: praskieskite 20 ml (2 valgomuosius šaukštus) 200ml vandens ir išgerkite valgydami. Prieš vartojimą suplakite.

ARTIŠOKAS 100 tablečių

Daržoviniai artišokai padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą. Sudedamosios dalys: smulkinti daržovinių artišokų (Cynara scolymus) lapai, daržovinių artišokų (Cynara scolymus) lapų ekstraktas (turi 5 % cinarino), fruktooligosacharidai (iš paprastųjų trūkažolių (Cichorium intybus) šaknų), užpildas kalcio fosfatai, maltodekstrinas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. 3 tabletėse yra: 570 mg smulkintų daržovinių artišokų (Cynara scolymus) lapų, 300 mg daržovinių artišokų (Cynara scolymus) lapų ekstrakto (kuriame 15 mg cinarino). Vartojimas: Rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2-3 kartus per dieną, valgio metu užsigeriant vandeniu. Įspėjimai: Per didelis fruktooligosacharidų vartojimas gali sukelti žarnyno diskomfortą.

*Maisto papildai**

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lrv.lt.

VAISTINIŲ KONTAKTAI

VILNIUS | Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642, Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520

KAUNAS | V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826

MASTAIČIAI | Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144
Kauno raj.

KLAIPĖDA | Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914

ŠIAULIAI | Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879

ALYTUS | Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088

BUTRIMONYS | Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244
Alytaus raj.

MIROSLAVO K. | Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587
Alytaus raj.

DRUSKININKAI | Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008

ELEKTRĖNAI | Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415

ABROMIŠKIŲ K. | Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310
Elektrėnų sav.

GIRKALNIS | Šėtupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523
Raseinių raj.

GRINKIŠKIS | Tilto g. 13-2, tel. (0 422) 63 388
Radviliškio raj.

GRIŠKABŪDIS | Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266
Šakių raj.

JONIŠKĖLIS | Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219
Pasvalio raj.

KAIŠIADORYS | Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745

KRUONIS | Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106
Kaišiadorių raj.

MICKŪNAI | Mickūnų g. 3, tel. (0 642) 73 215
Vilniaus raj.

SASNAVA | Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511
Marijampolės raj.

SEIRIJAI | Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939
Lazdijų raj.

SIMNAS | Alytaus g. 10, tel. (0 315) 426 16
Alytaus raj.

ŠAKIAI | V. Kudirkos g. 48, tel. (0 345) 51 516

VENTA | Žemaičių g. 31-43, tel. (0 425) 30 447

Užsisakykite prekes internetu **www.100metu.lt**
ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!

VAISTINĖS - PARTNERĖS

BALBIERIŠKIS
Prienų raj.
„Guobos vaistinė“
Sanatorijos g. 72
tel. (0 528) 27 310

IŠLAUŽAS
Prienų raj.
„Vitalijos vaistinė“
Kauno pl. 1
tel. (0 698) 45 977

KALVARIJA
Marijampolės raj.
„Kalvarijos vaistinė“
Ugniagesių g. 9
tel. (0 343) 21 257

KĖDAINIAI
„Kaštonų vaistinė“
J. Basanavičiaus g. 10
tel. (0 347) 67 244

MARIJAMPOLĖ
„Gubojos vaistinė“
R.Juknevičiaus g. 72-1
tel. (0 343) 97 372

KURŠĖNAI
„Kuršėnų vaistinė“
Vytauto g. 5
tel. (0 415) 85 747

Magnesium-Diasporal® *pro*

*Maisto papildai**

15,26 €

15,48 €

14,38 €

„Magnesium-Diasporal® Pro“ linijos produktuose didelės magnio dozės derinamos su kitomis gyvybiškai svarbiomis maistinėmis medžiagomis – visiems, kurie nori gyventi aktyvų gyvenimą. Ar jau žinote apie kitus mūsų produktus, skirtus raumenims ir nervams[1], raumenims ir kaulams[2] bei miegui[3]?

„Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir nervams[1]. Magnis palaiko normalią raumenų funkciją. Vitaminai B1, B2, B6 ir B12 prisideda prie normalios nervų sistemos veiklos ir energijos apykaitos. Todėl „Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir nervams[1] aprūpina jūsų organizmą didele magnio ir B grupės vitaminų doze – kaip praktiškas tiesiai į burną vartojamų granulių paketėlis.

„Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir kaulams[2]. Magnis palaiko normalią raumenų funkciją. Vitaminas D palaiko normalią imuninės sistemos veiklą. Geriausios sąlygos savarankiškam ir aktyviam gyvenimui. „Magnesium-Diasporal® Pro“ raumenims ir kaulams[2] yra didelės dozės magnio, vitamino D3 ir K2 derinys – kaip praktiškas tiesiai į burną vartojamų granulių paketėlis.

„Magnesium-Diasporal® Pro“ miegui[3]. Magnis, kaip ir vitaminai B2 ir B6, dalyvauja normalios raumenų funkcijos procesuose, padeda raumenims atsipalaiduoti ir prisideda prie normalios nervų sistemos veiklos. „Miego hormonas“ melatoninas savo ruožtu paruošia tavo kūną ir protą miegui.[3] „Magnesium-Diasporal® Pro“ miegui[3] yra kruopščiai suderintas magnio, melatonino, vitamino B2 ir B6 derinys - kaip praktiškas tiesiai į burną vartojamas granulių paketėlis.

Pasiūlymai galioja 2026 m. sausio 1 - 31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

Daugiau informacijos rasite www.ramunelesvaistine.lt ir www.100metu.lt