

RUGSĖJO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2026 09 01 - 2026 09 30



PASITIKITE ŠALTĄJĮ SEZONĄ UŽTIKRINTAI: KAIP PASIRŪPINTI GERKLĖS IR KVĖPAVIMO TAKŲ KOMFORTU?

Atvėsus orams ir prasidėjus peršalimo sezonui, žvarbus vėjas, sausas patalpų oras bei staigūs temperatūros pokyčiai tampa tikru išbandymu mūsų kvėpavimo takams. Kad rudenį ir žiemą lydetų komforto pojūtis, svarbu laiku pasirūpinti natūralia gleivinių priežiūra bei stiprinti organizmo apsaugą. „Silvanols“ siūlo gamtos įkvėptus sprendimus visai šeimai.

Pirmiesiems nemaloniems pojūčiams ir gleivinės drėkinimui puikiai tinka aliejiniai bei augaliniai purškalai. Klasikinis ir apelsinų skonio FARINGOSPRAY su šaltalankių bei medetkų aliejiniais ekstraktais padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės, burnos ertmės ir kvėpavimo takų būklę. Mažiesiems sukurta švelni formulė – FARINGOSPRAID Kids (nuo 4 m.), kurioje esantys šaltalankiai, čiobreliai ir liepžiedžiai padeda palaikyti gerklės bei viršutinių kvėpavimo takų komfortą.

Gamtos jėga ir bičių produktų apsauga pasižymi LARINGOSPRAID purškalas. Dėl sudėtyje esančio standartizuoto propolio (bičių pikio) ir medetkų ekstraktų derinio, šis purškalas suteikia tikslingą pagalbą viršutiniams kvėpavimo takams: medetkos padeda palaikyti normalią gerklės, ryklės bei burnos ertmės gleivinės būklę.

Aktyviam gyvenimo ritmui ir patogiam vartojimui tinka minkštosios FARINGO Soft čilpiamosios pastilės (nuo 4 m.) be pridėtinio cukraus ir laktozės. Sudėtyje esantis vaistinių svilarožių ekstraktas suteikia raminamąjį poveikį gerklės ir ryklės gleivinei, vitaminas C prisideda prie normalios imuninės sistemos veiklos bei ląstelių apsaugos nuo oksidacinės pažeidimo, o biotinas ir riboflavinas (vit. B2) padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. Formulė papildyta hialurono rūgštimi bei šaltalankių uogų aliejumi.

Kompleksiniam kvėpavimo takų palaikymui iš vidaus rekomenduojamos ATMOSIL kapsulės (nuo 12 m.). Paprastųjų pušų ekstraktas padeda palaikyti lengvą kvėpavimą ir kvėpavimo takų funkciją, o turtingą sudėtį papildoma bosvelijų, pasiflorų, akišveičių, gebenių bei anyžių ekstraktai kartu su kvercetinu, resveratroliu, likopenu ir astaksantinu. Pasirinkite tinkamiausią „Silvanols“ derinį savo vaistinėlėje ir pasitikite žvarbius orus pasiruošę!

-30%



Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt



Pasiūlymai galioja 2026 m. rugsėjo 1 d. - 30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvt.lt.

NEGYDOMAS HEMOROJUS SAVAIME NEPRAEIS

Statistika rodo, kad tik vienas iš keturių hemorojumi sergančių žmonių kreipiasi į gydytoją, todėl renkantis gydymo priemonę svarbu atsiminti, kad poveikį lemia veiklioji medžiaga. Ieškant veiksmingo gydymo, padedančio sumažinti hemorojaus simptomus, vaistinėje verta teirautis medicininių priemonių, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos – sukralfato.

Kaip veikia sukralfatas?

Sukralfatas – veiklioji medžiaga, naudojama gleivinei apsaugoti bei gleivinės ir odos pažeidimams gydyti. Jis prie pažeisto paviršiaus jungiasi 6–7 kartus stipriau nei prie sveikos gleivinės, todėl suformuoja lipnų apsauginį sluoksnį, kuris išlieka reikiamoje vietoje, nenubėga, ir apsaugo pažeistus audinius.

Sukralfatas taip pat pasižymi audinius apsaugančiu poveikiu. Susidariusi apsauginė plėvelė padengia mikrotrūkumus ir plyšimus, padeda mažinti uždegimą bei pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Ši veiklioji medžiaga ne tik padeda gyti gleivinės ir odos pažeidimams, bet ir skatina epitelio formavimąsi bei audinių regeneraciją.

Hemorojus savaime nepraeina, tačiau laiku diagnozavus ligą, jos gydymas paprastai būna paprastesnis ir veiksmingesnis. Negydant hemorojaus, mazgai gali didėti, dažnėti kraujavimas, stiprėti diskomfortas ir atsirasti skausmas.

Vietinio poveikio priemonės, tokios kaip, Repaherb, gali padėti greičiau palengvinti tokius simptomus kaip uždegimas, skausmas, niežėjimas ir deginimo pojūtis. Repaherb tiesiosios žarnos tepalą ar žvakutes su sukralfatu galima vartoti ir nėštumo bei žindymo laikotarpiu. Rekomenduojama vartoti 1–2 kartus per dieną, atsižvelgiant į simptomų stiprumą, 7–10 dienų.

Repaherb sudėtyje taip pat yra hamamelio lapų ekstrakto, kuris naudojamas dėl priešuždegiminių ir kraujavimą mažinančių savybių. Jis padeda raminti odą, mažinti niežėjimą, skatina pažeistų audinių gijimą ir palengvina hemorojaus simptomus. Hamamelis yra gerai žinomas medicininis augalinis preparatas venų ligoms, venų varikozei ar hemoroidui gydyti, kuris ne tik didina venų tamprumą, bet ir mažina kapiliarų pralaidumą.**

Sukralfato poveikis greitesniam žaizdų gijimui buvo vertintas ir klinikiniuose tyimuose*. Viena jų buvo lyginamas sukralfato ir lidokaino poveikis skausmo intensyvumui bei žaizdų gijimui po hemorojaus mazgų pašalinimo. Tyrimo duomenimis, sukralfatas padėjo ne tik sumažinti ūminį pooperacinį skausmą, bet ir pagerino žaizdų gijimą.

Šaltiniai: *Double blinded randomized placebo-controlled comparative study between sucralfate ointment and lidocaine ointment after Milligan Morgan hemorrhoidectomy. 2017, DOI: <http://dx.doi.org/10.18203/2349-2902.isj20175111>
**Produkto SmPC

REPAHERB tiesiosios žarnos žvakutės N10 11,56€
REPAHERB tepalas 25 g 11,56€

Medicinos prietaisai

„Repaherb“ tiesiosios žarnos tepalas, 25 g ir žvakutės, N10, skirtos su hemoroidais ir jo komplikacijomis susijusiems simptomams lengvinti. Repaherb ne tik mažina odos džiuvimą, įtrūkių bei pažeidimų atsiradimą tuštinantis, bet ir nuramina uždegimo apimtą, niežtinčią odą bei skatina žaizdų gijimą. Teksto parengimo data 2026 08.

-20%

BET KOKIAM KOSULIUI - LENGVINA SAUSĄ IR DRĖGNĄ KOSULĮ



AFLUBIN PLUS sirupas nuo kosulio, 175 ml.

Medicinos priemonė

Sudėtyje yra natūralios kilmės sudedamųjų dalių. Padeda palengvinti kosulį, sušvelninti dirginimą ir skatinti susikaupusių gleivių pašalinimą. Aflubin®Plus sirupo nuo kosulio sudėtyje esantys polisacharidai suformuoja lipnų gleivinės gelį, veikiantį kaip apsauginė priemonė ir barjeras, kuris riboja kontaktą su išoriniais veiksniais ir dirgikliais. Dozavimas ir vartojimo būdas: vaikams nuo 3 iki 6 metų: 5 ml 2 kartus per parą; vaikams nuo 6 iki 12 metų: 5 ml iki 4 kartų per parą; vyresniems, kaip 12 metų vaikams ir suaugusiems: 10 ml 4 kartus per parą. Sudedamosios dalys: Maumedžio arabinolaktanas, islandinė kerpena, medus, fruktozės sirupas, obuolių sulčių koncentratas, gysločių ekstraktas, svilarčių ekstraktas, apelsinų kvapioji medžiaga, karajos guma, apelsininio citrinmedžio eterinis aliejus, karamėlė.



COLDREX tabletės 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, N12

6 07 €

COLDREX tabletės 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, N24

8 83 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Dozavimas: suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, sveriantiems daugiau nei 54 kg gerti po 2 tabletes kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12–16 metų paaugliams, kurių kūno svoris 43–54 kg gerti po vieną tabletę kas 4–6 val., jei reikia. Didžiausia paros dozė yra 4 tabletės per 24 val. Nevartoti dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Nevartoti ilgiau kaip 3 dienas. Vartojimo būdas: nuryti tabletes nekramčius, užgeriant reikiamu skysčiu kiekiu. Specialūs įspėjimai: Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užguliosios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Coldrex, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga. Jeigu pajutote metabolinės acidozės simptomų derinį: nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra kofeino. Vaisto vartojimo metu nevartokite kitų produktų, kuriuose yra kofeino. Pasitarkite su gydytoju, jeigu vartojate kitų vaistų. Vartojant šio vaisto negalima gerti alkoholinių gėrimų. Nepatartina vairuoti ir valdyti mechanizmų, jei pasireiškia galvos svaigimas. Sudėtyje yra natrio ir dažiklio saulėlydžio geltonjojo (E110). Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu padidėjęs kraujospaudimas ar skydliaukės aktyvumas; jeigu sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždarą kampo glaukoma, feochromocitoma, kepenų ar sunkia inkstų liga; jeigu esate nėščia ar žindote kūdikį; jeigu vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; jeigu vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg. Informacija sutrumpinta! Reklamos teksto parengimo data: 2026-08-05



COLDREX HotRem HONEY & LEMON 750 mg/10 mg/60 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10

8 54 €

COLDREX MaxGrip LEMON 1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, N5

5 34 €

COLDREX MaxGrip LEMON 1000 mg/10 mg/40 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10

8 54 €

COLDREX MaxGrip MENTHOL & BERRIES 1000 mg/10 mg/70 mg milteliai geriamajam tirpalui, N10

8 54 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Terapinės indikacijos: trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas. Vartojimo būdas: suberti vieno paketėlio turinį į stiklinę, pripilti karšto vandens (maždaug 125 ml), gerai išmaišyti, kol milteliai ištirps. Pagal poreikį pripilti šalto vandens. Dozavimas: Suaugusiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 m. bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: po 1 paketėlį kas 4–6 val., jei reikia. COLDREX HotRem LEMON, COLDREX HotRem HONEY & LEMON: Didžiausia paros dozė: 5 paketėliai per 24 val. COLDREX MAXGRIP LEMON: COLDREX MaxGrip MENTHOL & BERRIES: Didžiausia paros dozė: 4 paketėliai per 24 val. Specialūs įspėjimai: Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užguliosios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti, jei: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilberto (Gilbert) sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika. Vartojant negalima gerti alkoholinių gėrimų dėl galimo kepenų pažeidimo. Nėštumo metu ir žindymo laikotarpiu vartoti negalima. Kontraindikacijos: jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; padidėjęs kraujospaudimas; padidėjęs skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu; sergate širdies liga; sergate uždarą kampo glaukoma; sergate feochromocitoma; sergate kepenų ar sunkia inkstų liga; esate nėščia ar žindote kūdikį; vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. Reklamos teksto parengimo data: 2026-04-01

HERBION 35 mg kietosios pastilės

6 57 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 35 mg Hedera helix L., folium (gebenių lapų) sausosios ekstrakto (5–7,5:1). Terapinės indikacijos: Herbio 35 yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikojimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui suaugusiems, paaugliams ir 6 metų bei vyresniems vaikams. Dozavimas ir vartojimo būdas: Įprasta dozė 6–11 metų vaikams yra 1 kietoji pastilė du kartus per parą. Suaugusiems, senyviams žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams yra 1 kietoji pastilė tris kartus per parą. Vartoti ant burnos gleivinės. Leisti pastilei lėtai ištirpti burnoje. Jei simptomai išlieka šio vaistinio preparato vartojant ilgiau kaip savaitę, pacientui būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems gebenių šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai: Jei pasireiškia dispnėja (dusulys), karščiavimas arba atkosima pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydomo metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių vaistinių preparatų, tokių kaip kodeinas ar deksmetorfanas, nerekomenduojama. Gastritui ar skrandžio opaligė sergantiems ligoniams vaistinio preparato rekomenduojama vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 12 07.

HERBION 7 mg/ml sirupas

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Herbio 7 mg/ml sirupas, 1 ml sirupo yra 7 mg Hedera helix L., folii (gebenių lapų) sausosios ekstrakto (5–7,5:1). Herbio 7 yra augalinis vaistinis preparatas, kurio vartojama atsikojimui lengvinti pasireiškus drėgnam kosuliui. Suaugę žmonės, senyvi, 12 metų paaugliai ir vyresni. Du kartus per parą gerti 57,5 ml sirupo (atitinka 70105 mg gebenių lapų sausosios ekstrakto paros dozę). 612 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 5 ml sirupo (atitinka 70 mg gebenių lapų sausosios ekstrakto paros dozę). 25 metų vaikai. Du kartus per parą gerti 2,5 ml sirupo (atitinka 35 mg gebenių lapų sausosios ekstrakto paros dozę). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kitiems Araliaceae (gebenių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientas yra jaunesnis kaip 2 metų vaikas. Specialūs įspėjimai ar atsargumo priemonės. 24 metų vaikų nuolatinį ar pasikartojantį kosulį galima pradėti gydyti tik nustatius medicininę diagnozę. Jei pasireiškia dispnėja, karščiavimas arba atkosima pūlinių skreplių, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Gydomo Herbio 7 metu be gydytojo leidimo vartoti kosulį slopinančių preparatų, tokių kaip kodeinas ar deksmetorfanas, nerekomenduojama. Reklamos teksto parengimo data 2022-03-21.



6 85 €

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoji, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lt.

-30%

SAUSAM, DIRGINANČIAM
KOSULIUI

HERBISLAND 6 mg/ml sirupas

Medicinos priemonė

Herbisland sirupo sudėtyje yra islandinių kerpenų ekstrakto.

Herbisland rekomenduojamas vartoti pasireiškus:

- sausam, dirginančiam kosuliui;
- užkimimui;
- gerklės skausmui.

Herbisland sumažina kosulio receptorių dirginimą ir sudrėkina sausą ryklės gleivinę.

Tinka vaikams nuo 1 metų amžiaus. Be cukraus (į sudėtį įeina natūralios kilmės sorbitolis). Malonaus citrinų skonio.

Kaip vartoti Herbisland?

1-4 metų vaikams – 2,5 ml (1/2 matavimo šaukšto) x 4 k./d.

4-10 metų vaikams – 5 ml (1 matavimo šaukštas) x 4 k./d.

10-16 metų vaikams – 10 ml (2 matavimo šaukštai) x 4 k./d.

16 metų ir vyresniems – 15 ml (3 matavimo šaukštai) x 4 k./d.

Negalima vartoti dažniau kaip 4 kartus per parą. Jei po 7 dienų simptomai nepalengvėja, pasitarkite su gydytoju.



HERBISLAND kietosios pastilės, N16

Medicinos priemonė

Gerklės dirginimui, užkimimui ir sausam kosuliui malšinti.

Be cukraus. Apelsinų skonio.

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg islandinių kerpenų sausos ekstrakto (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus) (atitinkančio 90-120 mg islandinių kerpenų). Tai yra tradicinis augalinis preparatas, kuris rekomenduojamas suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams ryklės ir burnos gleivinės dirginimui ir su tuo susijusiam sausam kosuliui palengvinti. Islandinių kerpenų ekstrakto sudėtyje yra didelis kiekis vandenyje tirpių gleivių, kurios, manoma, padengia, apsaugo ir drėkina burnos bei gerklės gleivinę bei sumažina jos dirginimą. Įprastinė dozė suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams yra 1 kietoji pastilė aštuonis kartus per dieną.



8 10 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA



SEPTABENE, 3 mg/1 mg, kietosios pastilės N16

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Eukaliptų skonio / Citrinų ir šėvamedžio skonio / Citrinų ir medaus skonio / Kolos skonio

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 3 mg benzidamino hidrochlorido ir 1 mg cetilpiridinio chlorido. Terapinės indikacijos: „Septabene“ dezinfekuoja burną ir ryklę, lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. „Septabene“ vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti: jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas; sergant dantenų uždegimu (gingivitu) ir ryklės uždegimu (faringitu); prieš dantų traukimą ir po jo. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusieji: rekomenduojama paros dozė yra 3-4 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 val.; 6-12 m. vaikai: rekomenduojama paros dozė yra 3 kietosios pastilės. Kietąją pastilę reikia lėtai ištirpinti burnoje kas 3-6 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 m. vaikas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Septabene“ negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika: „Septabene“ negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Kietųjų pastilių negalima vartoti kartu su pienu, nes jis silpnina cetilpiridinio chlorido antimikrobinį poveikį. Reklamos teksto parengimo data 2024-02-27.

9 49 €

TAVO GERKLĖ - TAVO JĖGA



SEPTABENE 1,5 mg/5 mg/1 ml burnos gleivinės purškalkas 30 ml

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Septabene dezinfekuoja burną ir ryklę bei lengvina ryklės uždegimo požymius: skausmą, paraudimą, patinimą, karštį ir funkcijos sutrikimą. Septabene vartojamas uždegimui ir skausmui mažinti bei antiseptiniam poveikiui sukelti:

- jei yra ryklės, burnos ir dantenų dirginimas;
- sergant dantenų uždegimu (gingivitu), ryklės uždegimu (faringitu) ir gerklų uždegimu (laringitu);
- prieš dantų traukimą ir po jo.

Dozavimas suaugusiems. Vienkartinė dozė yra suvartojama purškštuvo galvutę paspaudus vieną arba du kartus. Tokią dozę kartotina galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. 6-12 metų vaikams. Vienkartinė dozė yra suvartojama purškštuvo galvutę paspaudus vieną kartą. Tokią dozę kartotina galima vartoti kas 2 valandas 3-5 kartus per parą. Kontraindikacijos ir specialieji perspėjimai. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms. Pacientas yra jaunesnis kaip 6 metų vaikas. Septabene negalima vartoti ilgiau kaip 7 dienas. Jei po 3 dienų pastebimo gydymo poveikio nebūna, pacientas turi pasitarti su gydytoju. Septabene negalima vartoti tuo pat metu kartu su kitais antiseptikais. Vaistinio preparato negalima įkvėpti. Teksto peržiūros data: 2023 08 09.

5 27 €

ATKEMŠA UŽGULUSIĄ NOSĮ IR
ŠVELNIAI GYDO IŠSAUSĘJUSIĄ
NOSIES GLEIVINĘ



SEPTANAZAL 1 mg/50 mg/ml nosies purškalkas (suaugusiems)

SEPTANAZAL 0,5 mg/50 mg/ml nosies purškalkas (vaikams)

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Septanazal nuo 6 metų amžiaus vartojamas:

- nosies gleivinės paburkimui mažinti sergant nosies gleivinės uždegimu (rinitu) bei gleivinės pažeidimo gijimui skatinti;
 - nealerginiam nosies gleivinės uždegimui (vazomotoriniam rinitui) lengvinti;
 - kvėpavimo pro nosį pasunkėjimui po nosies operacijos šalinti.
- Rekomenduojama dozė 6 metų bei vyresniems vaikams yra po vieną įpurškimą į kiekvieną šnervę iki 3 kartų per parą. Septanazal suaugusiems vartoti negalima, jeigu yra alergija ksilometazolino hidrochloridui, dekspanthenoliui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu Jums arba Jūsų vaikui yra sausasis nosies gleivinės uždegimas ir atsiranda sašų (sausasis rinitas), jeigu Jums arba Jūsų vaikui buvo chirurginiu būdu pašalinta posmegeninė liauka arba buvo atlikta kita operacija, susijusi su smegenų dangalais. Specialūs įspėjimai. Septanazal galima vartoti tik atidžiai įvertinus rizikos ir naudos santykį, jeigu: pacientas yra gydomas monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) ar kitokiais kraujospūdį didinančiais vaistiniais preparatais, yra padidėjęs akispūdis (ypač jei sergama uždarą kampo glaukoma), pacientas serga sunkia širdies ir kraujagyslių liga, yra feochromocitoma, yra metabolinių sutrikimų, yra porfirija, yra prostatos hiperplazija. Teksto peržiūros data 2026 02 17.

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĘ.



IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 4 44 €

IBUPROM, 400 mg, 20 dengtųjų tablečių 5 13 €

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 6 65 €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veiklosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Terapinės indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprofen Express, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas 4 val. (negerti daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekratyti). „Ibuprofen, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprofen, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, ūminis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiajam nėštumo trimestrai. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Reklamos teksto parengimo data 2026.03.23

8 77 €

RENKUOSI „IBUPROM“. RENKUOSI LAISVĘ.



IBUPROM, 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 ml „Ibuprofen“ 40 mg/ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. Indikacijos: trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. „Ibuprofen“ skirtas 3 mėn. ir vyresniems kūdikiams ir vaikams. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. 3–6 mėn. kūdikiams (> 5 kg) gerti po 1,25 ml 3 k. per parą, 6–12 mėn. kūdikiams (8–10 kg) – po 1,25 ml 3–4 k. per parą, 1–3 m. vaikams (10–15 kg) – po 2,5 ml 3 k. per parą, 3–6 m. vaikams (15–20 kg) – 3,75 ml 3 k. per parą, 6–9 m. vaikams (20–30 kg) – po 5 ml 3 k. per parą, 9–12 m. vaikams (30–40 kg) – po 7,5 ml 3 k. per parą. Nurodytą vaisto dozę reikia skirti maždaug kas 6–8 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU) ar bet kuriai pagalbinei medžiagai, kitų NVNU vartojimas, kraujo krešėjimo sutrikimai, paskutinis nėštumo trimestras, trombocitopenija, sunkus kepenų, inkstų ar širdies nepakankamumas, praeityje buvusios padidėjusio jautrumo reakcijos (astma, rinitas, angioneurozinis pabrinkimas, dilgėlinė) vartojant kitą NVNU, įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius, esama ar buvusi pepsinė opa / hemoragija, buvęs kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su anksčiau NVNU vartojimu, kraujavimas į smegenis, virškinimo trakto ar kitos kraujavimas, sisteminė raudonoji vilkligė. Specialūs įspėjimai: senyviams pacientams, pacientams, turintiems inkstų, kepenų, žarnyno, virškinimo trakto problemų, pacientams, kuriems anksčiau buvo virškinimo trakto opa ar infarktas, sergantiesiems diabetu, sisteminė raudonoji vilkligė, širdies nepakankamumu, virškinimo trakto opa, hipertenzija, bronchų astma, rūkantiems pacientams, taip pat pacientams, kuriems padidėjęs cholesterolio kiekis, yra įgimtas porfirozės sutrikimas, dehidratacija, vartojantiems vaistus, galinčius padidinti opų ar kraujavimo pavojų, ibuprofeną reikia vartoti atsargiai. Reklamos teksto parengimo data 2024.12.12

7 85 €



TONUFEN 200 mg/30 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veiklosios medžiagos, stiprumas: vienoje „Tonufen“ dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido. Indikacijos: trumpalaikiai simptominiams nosies ir ančių užsikimšimo, susijusio su peršalimo, gripo ar alerginio rinito simptomais, pavyzdžiui, galvos skausmu, rinosinusu, karščiavimu, ryklės skausmu, raumenų maudimu ir skausmu, gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 1 arba 2 tabletės per burną kas 4 valandas. Per 24 val. laikotarpį negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai ar pagalbinei medžiagai, praeityje pasireiškusios alerginės reakcijos acetilsalicilo rūgščiai ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo. Esant virškinamojo trakto sutrikimams, kepenų, inkstų nepakankamumui, hemoraginei diatezei, sunkiam širdies nepakankamumui, hipertenzijai, nėštumui, žindymo laikotarpiui, vartojant kitus nosies užsikimšimą mažinančius vaistus, sergant širdies kraujagyslių ligomis, hipertiroze, cukriniu diabetu, uždaro kampo glaukoma, vartojantiems MAO inhibitorius, esant diagnozuotai feochromocitomai. Specialūs įspėjimai: atsargiai reikia vartoti pacientams, kuriems nustatytas inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas, praeityje sirgusiems astma ar alergine liga, serganti raudonąja vilkige, sirgusiems virškinamojo trakto ligomis, hipertenzija, širdies nepakankamumu, senyviams pacientams. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Teksto parengimo data: 2025-09-17.

8 84 €

„INOVOX“. EFEKTAS – JAU PO 1 MINUTĖS



INOVOX MENTHOL, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX ORANGE, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

INOVOX HONEY LEMON, 2 mg/0,6 mg/1,2 mg, kietosios pastilės N24

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veiklosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje pastilėje yra 2 mg lidokaino hidroklorido, 0,6 mg amilmetakrezolio ir 1,2 mg 2,4-dichlorobenzilo alkoholio. Indikacijos: gerklių skausmo malšinimas, vietinis antiseptinis gerklių ir burnos ertmės uždegiminių būklių (pvz., paraudimo, patinimo) gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: po 1 kietąją pastilę kas 2–3 val. ir kai reikia, bet ne daugiau kaip 8 kietąsias pastiles per parą (vaikams – ne daugiau kaip 4 pastiles). Vartoti ant burnos gleivinės. Kietąją pastilę reikia lėtai sučiulpti laikant burnoje, bet ne už skruosto. Vaisto nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip 5 paras. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veiklosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima vartoti jaunesniems kaip 12 m. vaikams. Specialūs įspėjimai: jei simptomai neišnyksta ilgiau kaip 2 paras, sunkėja, arba atsiranda naujų simptomų, reikia įvertinti paciento klinikinę būklę. Atsargiai vartoti ūminę ligą sergantiems, nusilpusiems pacientams. Nevartoti esant ūmioms burnos ir gerklių žaizdoms, prieš valgant ar atsigeriant. Astma sergantys pacientai turi būti prižiūrimi gydytojo. Sudėtyje yra levomentolio terpenų, gliukozės, sacharozės, saulėlydžio geltonojo ir košenilio raudonojo. Reklamos teksto parengimo data 2022-06-09.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!



LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N30 LIVOSIL, 140 mg kapsulės, N60

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. Indikacijos: papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekratyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. Specialūs įspėjimai: silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su mažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemija), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

3 75€



ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neirios kietosios kapsulės

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali prireikti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepatraukiamą gydymą simptomai neišnyksta, pacientas turi kreiptis į gydytoją. Nėra tinkamų „Escadra“ vartojimo rekomendacijų jaunesnių kaip 18 metų vaikų populiacijoje indikacijai „trumpalaikis gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir rūgšties regurgitacijos) gydymas“. Kapsulių negalima kramtyti ar smulkinti. Kapsules galima atidaryti ir granules išmaisyti puselę šilkinės negazuoto vandens. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, pakaisiems benzimidazolams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ezomeprazolo negalima vartoti kartu su nelfinaviru. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pacientus reikia informuoti, kad kreiptis į gydytoją, jeigu jie patiria didelį kūno svorio mažėjimą dėl nežinomų priežasčių, pasikartojanti vėmimą, distagiją, vėmimą krauju ar melena arba jeigu įtariama ar diagnozuojama skrandžio opa, būtina iširti, ar nėra piktybinės ligos, nes gydymas ezomeprazolu gali palengvinti jos simptomus ir uždelsti diagnozės nustatymą, jeigu jie anksčiau sirgo skrandžio opa arba patyrė virškinimo trakto operaciją; jeigu jiems 4 savaites arba ilgiau buvo taikomas nepatraukiamas simptominis nevirškinimo arba rėmens gydymas; jeigu jie serga gelta arba sunkia kepenų liga; jeigu jie yra vyresni kaip 55 metų ir turi naują arba neseniai pakitusių simptomų. Pacientai, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliarius intervalus lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su savo gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinį preparatą. Ezomeprazolą skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartinas. Kitų PPI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygių. Reklamos teksto parengimo data 2025-08-18.

JEI PILVE URAGANAS – JUMS PADĖS ESPUMISANAS!



ESPUMISAN 40mg minkštosios kapsulės N25

3 22€

ESPUMISAN 40mg minkštosios kapsulės N50

5 11€

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklioji medžiaga: vienoje minkštojoje kapsulėje yra 40mg simetikono. Espumisan vartojamas ligų, kurių metu virškinimo trakte kaupiasi dujos (meteorizmas), būna pilvo pūtimas, pilnumo pojūtis, simptominiams gydymui; prieš pilvo ertmės organų tyrimus, pvz.: rentgenu, ultragarsu. Espumisan skirtas vaikams nuo 6 metų, paaugliams ir suaugusiems. Espumisan vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai, dažikliui saulėlydyžio geltonajam FCF (E110), konservantui metilo parahidroksibenzoatui (E218) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Espumisan. Jei šie virškinimo veiklos sutrikimai atsiranda ar jie trunka ilgiau, reikia pasitarti su gydytoju. Jis nustatys, ar nėra kitokio gydymo reikalaujantių ligų. Dozavimas: kai dėl susilaikiusių dujų sutrinka virškinimo trakto veikla: paaugliams ir suaugusiems, bei 6–14 metų amžiaus vaikams rekomenduojama skirti vartoti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3–4 kartus per parą. Espumisan 40 mg minkštasias kapsules galima gerti valgant arba po valgio, prireikus – ir prieš miegą. Vartojimo trukmė priklauso nuo ligos eigos. Prireikus Espumisan 40 mg minkštasias kapsules galima vartoti ilgiau. Rengiant pacientus tyrimams rekomenduojama skirti po dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules 3 kartus per parą vieną dieną prieš tyrimus ir dvi Espumisan 40 mg minkštasias kapsules tyrimo dienos ryte. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasiūnų g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Esp_17_2023_V1_pharma

-40%




VALIDOL Aconitum – jūs gerai savijautai!

Maisto papildas*

Sudėtyje esantis vaistinių valerijonų ekstraktas padeda atsipalaiduoti bei palankiai gerą psichologinę būseną. Vartojimas: Tabletes reikia laikyti po liežuviu tol kol ji visiškai ištirpsta. Vartojama po 1 tabletę 2-4 kartus per dieną.

-40%



„Acosedum+“ – skystas maisto papildas vandens pagrindu (be etanolio) jautriai nervų sistemai. Sudėtyje esantis vaistinio valerijono ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę būseną bei atsparumą stresui. Normalią miego kokybę padeda palaikyti vaistinių ramūnių ir tikrųjų levandų žiedų ekstraktai, o nervų sistemos veiklą – vitaminas B6. Šio preparato sudėtis praturtinta rausvąja rodiola, kuri padeda palaikyti organizmo prisitaikymą. Tinka ir vaikams nuo 3 metų. Vartojimas: 3-6 metų vaikams po 5 lašus, 6-12 metų vaikams po 10 lašų, nuo 12 metų ir suaugusiems po 20 lašų 2 kartus per dieną.

Maisto papildas*

LENGVAM NERIMUI MALŠINTI IR MIEGUI PALENGVINTI



LILANDOR 80 mg, minkštosios kapsulės, N14 arba N28

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Lilandor yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Netinka vartoti jaunesniems negu 12 metų vaikams. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skysto kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. LT-LIL-10-2025_MFLOW, 2025/12 Atgauk ramybę ir ramų miegą

-50%

PASAKYK STRESUI STOP!



STOP STRESS®, 30 kapsulių

STOP STRESS® sudėtyje yra 17 komponentų: vitaminų, aminorūgščių, mineralų ir augalų ekstraktų. Tikrieji imbierai padeda palaikyti normalią energiją, o raudonžiedžių pasiflorų, pipirinių mėtų ir vaistinių melisų ekstraktai padeda atsipalaiduoti. STOP STRESS® sudėtyje esantys B grupės vitaminai – niacinas, tiaminas, riboflavinai ir vit. B6 - padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, o foliatai - normalią psichologinę funkciją.

STOP STRESS® Night, 30 kapsulių

STOP STRESS® Night esantys valerijono ir apynio bei pasifloros ekstraktai padeda atsipalaiduoti ir padeda palaikyti normalų miegą.

STOP STRESS® Herbal, 30 kapsulių

STOP STRESS® Herbal padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vaistiniai valerijonai padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir protinę veiklą. Vaistinės melisos padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Paprastosios sukatžolės padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.

Maisto papildai*

-50%



KORVALOLS N geriamieji lašai 25 ml KORVALOLS N skystis 90 ml

Maisto papildas*

Klasikinės sudėties maisto papildas, papildytas natūraliais paprastųjų apynių ir pipirmėčių eteriniais aliejais. Apyniai nuo seno vertinami dėl savo savybių padėti lengviau užmigti ir palaikyti ramią nervų sistemą, o pipirmėčių aliejus padeda atsipalaiduoti bei palaiko normalią virškinimo veiklą.

GYSLIOČIŲ BALZAMAS, skystis 120 ml

Maisto papildas*

Su siauralapio gysločio ekstraktu, padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją ir gerklių komfortą. Gysločio lapai padeda stiprinti imuninę sistemą ir palaiko organizmo apsaugą nuo nepalankių aplinkos veiksnių. Vaikams nuo 3 metų.

-40%

GERAM POILSIUI - SILDUS MIEGAS



Linija „Saldus miegas“ - viena iš populiariausių maisto papildų linijų miegui Lietuvoje. Greitesniam užmigimui ir kokybiškam poilsiui su fitomelatoninu (augaliniu melatoninu). „Saldus miegas“ - net 7 aktyviųjų medžiagų kompleksas, kurio sudėtyje vaistinių ramunų žiedų ekstraktas, padedantis palaikyti normalią miego kokybę. „Saldus miegas fitoMELATONINAS“ preparate yra 1 mg fitomelatonino. „Saldus miegas eliksyras“ karamelės skonio, skystas maisto papildas. Sudėtyje yra GASR (Gama-amino sviesto rūgštis), 5-hidroksitriptofano (5- HTP) ir 1 mg fitomelatonino, kuris padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę (teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti).

Maisto papildas*

-40%

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!



„Vironox“ linija – epigenetinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų.

„Stiprus imunitetas“, 7 paketėliai – tik 7 dienos organizmo apsaugai bei imunitetui. Vienaime paketėlyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Jėgoms atstatyti“, 14 paketėlių – maisto papildas siekiantiems greičiau atgauti jėgas. Kininių ženšenų šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį.

„Smeegenų rūkas“, 14 paketėlių – maisto papildas protinei veiklai. Rausvųjų rodiolių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. Niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją bei nervų sistemos veiklą. Raudonžiedžių pasiflorų žiedų ekstraktas padeda palaikyti normalią miego kokybę. Vartojimas: tik 1 paketėlis per dieną.

Balzamo „Veiksminga apsauga“ sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

Maisto papildai*

-40%

ATMINČIAI IR SMEGENŲ VEIKLAI



MEMORIL FORTE, 30 kapsulių

Maisto papildas*

Subalansuotas, 11 sudedamųjų dalių kompleksas atminčiai bei kraujotakai. Tinka tiems kuriems sunku susikaupti bei nuolat ką nors pamiršantiems. Vienoje kapsulėje yra 80 mg ginkmedžių ekstrakto, kuris padeda palaikyti normalią atminties funkciją ir kraujotaką. Taip pat sudėtyje yra magnio, vitaminų B, C, E, seleno ir folio rūgšties, kuri padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per dieną.

-20%



D-PEARLS VITAMINAS D3 40µG, 80 kapsulių
D-PEARLS VITAMINAS D3 80 µG, 80 kapsulių

Maisto papildas*

Mažos kapsulės, kuriose yra 40 arba 80 mcg vitamino D3. D-Pearls sudėtyje esantis vitaminas D yra išrūpintas šalto spaudimo alyvuogių aliejuje, kad būtų geriau įsisavinamas. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę. Pagaminta kontroliuojant Danijos farmacinės kontrolės įstaigoms.

-40%



KRIOMEGA+, kapsulės N30

Maisto papildas*

Žuvų taukai „KriOmega+“ yra iš krilių. Kriliai yra laikomi vienu geriausių, veiksmingiausių ir prieinamiausių omega-3 riebalų rūgščių šaltinių. Sudėtyje esantys omega-3 fosfolipidai, gaunami iš vėžiagyvių – krilių – ekstraktas, greičiau patenka į audinių ląsteles ir tolygiau pasiskirsto nei omega-3 trigliceridai, randami žuvų taukuose. Ypač aukštos kokybės krilių taukuose esančios EPR (eikozapentaeninės) ir DHR (dokozaheksaeninės) rūgštys padeda palaikyti širdies veiklą*, DHR rūgštys padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą**. Krilių taukų kapsules patogiu vartoti: jos nepalieka nemalonaus poskonio ir yra kelis kartus mažesnės nei įprastų žuvų taukų kapsulės. Užtenka tik 1 kapsulės per dieną.*Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.**Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

-40%



LIBIDO MOTERIŠKA ENERGIJA, skystis N14

Apelsinų skonio skystas maisto papildas moters seksualinei sveikatai ir gerai savijautai. Padeda palaikyti reprodukcinės sistemos funkciją ir vaisingumą bei libido. Normalią moters reprodukcinės sistemos funkciją ir normalią fizinę veiklą padeda palaikyti peruvinių pipirinių šaknų ekstraktas. Normalią odos būklę, normalią plaukų ir nagų būklę padeda palaikyti cinkas. Normalų vaisingumą padeda palaikyti standieji smidrai.

LIBIDO VYRIŠKA ENERGIJA, skystis N14

Obuolių skonio skystas maisto papildas energijai, libido, vaisingumui ir gyvybingumui. Daržinių krokų purkų ekstraktas (šafraus) padeda palaikyti normalų vaisingumą ir protinę veiklą. Kininio ženšenio šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią seksualinę veiklą ir organizmo gyvybingumą, o cinkas – normalią testosterono koncentraciją kraujyje bei reprodukcijos veiklą. Juodųjų eleuterokokų šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią fizinę ir imuninės sistemos veiklą.

Maisto papildai*

-40%



KALICORD 850 FORTE

Maisto papildai*

Sudėtyje yra net 850 mg kalio citrato, kuris papildo organizmą trūkstamam kalio kiekiui. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir normalią raumenų veiklą. Vartojimas: „Kalicord“ gerti po 1 kapsulę per dieną.

-40%

ECOSH – VEDAMI GAMTOS



ECOSH bioaktyvusis Selenas 150 mcg, 90 kapsulių

ECOSH bioaktyvusis Cinkas, bisglicinatas 25 mg, 90 kapsulių

ECOSH bioaktyvus vitaminų B kompleksas, 90 kapsulių

ECOSH NAC su erškėtuogėmis, 90 kapsulių

ECOSH Komplexas sąnariams, su kolagenu Collavant n2, 90 kapsulių

Maisto papildai*

ECOSH – Estijos maisto papildų gamintojas, siekiantis gaminti kuo natūralesnius, kokybiškus ir efektyvius maisto papildus. Naudojamos vegetariškos, augalinės kilmės kapsulės, maisto papildai yra be konservantų, dauguma tinkami vegetarams ir veganams.

1+1

NEGYVOSIOS JŪROS MINERALAI, PAPRASTOS FORMULĖS, BE NEREIKALINGŲ PRIEDŲ



Kalio ir magnio maisto papildai - klasikinė „Biofarmacija“ mineralų linija sukurta kasdieniam organizmo balanso palaikymui. Produktų sudėtyje naudojami natūralios kilmės Negyvosios jūros mineralai, vertinami dėl savo grynumo ir unikalių mineralinės sudėties. Miltelių forma - patogus būdas geresniam pasisavinimui, švelniam poveikiui organizmui, be nereikalingų priedų. Skirti žmonėms, siekiantiems palaikyti normalią raumenų veiklą, mineralų pusiausvyrą, nervų sistemos funkciją ir mažinti nuovargio pojūtį.

Maisto papildai*

1+1



Klasika tapę ir vieni perkamiausių „Biofarmacijos“ mineralų papildų Lietuvoje (2019–2025 m.).* Formulėse naudojami organinės kilmės mineralai, pasižymintys geru pasisavinimu. **Kalis** padeda palaikyti normalų kraujospūdį, normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Žmogaus organizme kalis daugiausia kaupiasi ląstelėse, ypač raumenyse, smegenyse ir kituose audiniuose. „bioKalis“ – perkamiausias kalio maisto papildas Lietuvoje 2019–2025 m. Pagal UAB „Softdent“ duomenis. **Šnarių ir kremzlių priežiūra** – jūrinės kilmės gliukozamino maisto papildas. Gliukozaminas yra natūralus aminopolisacharidas, esantis žmogaus organizmo audiniuose ir svarbus kremzlių bei jungiamojo audinio struktūrinis komponentas. **Kasdieniam kaulų ir dantų tvirtumui** – „Biofarmacijos“ kalcio formulės su Negyvosios jūros mineralais. Kalcis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę. **Kasdieniam imunitetui ir odos būklei** – „bioCINKAS 30“, pasižymintis geru pasisavinimu ir tinkamas cinko papildymui kasdienėje mityboje. **Geležies atsargoms ir energijai** – „bioFERRUM Acerola“, geležies ir natūralaus vitamino C (acerolos) derinys, sukurtas geram pasisavinimui ir švelniam toleravimui.

Maisto papildai*

1+1

SUTEIK TITANIŠKOS GALIOS SĄNARIAMS IR ŠIRDŽIAI!



„ATLANT MAXIMUS“ – didelės koncentracijos kolageno kompleksas sąnariams (15 000 mg), papildytas hialurono rūgštimi (500 mg), ciberžolių (500 mg) ir bosvelijų (100 mg) ekstraktais.

„ATLANT ŠIRDIS“ – pažangi formulė širdžiai su didžiausiu polifenolių kiekiu* (resveratrolio 260 mg ir likopeno 13 mg), kofermentu Q10, mineralais K, Mg, Fe, vitaminu B1, gudobelių, ciberžolių ir raudonojo ir dresano ekstraktais. *Nustatyta pagal UAB „Softdent“ 2024 m. duomenis.

„COR 4 COMPLEX“ – „Biofarmacija“ sukurta keturių veiklių medžiagų kompleksas, skirtas širdies ir kraujagyslių sistemos veiklai palaikyti. Miltelių forma užtikrina patogų vartojimą, gerą pasisavinimą ir sudėtyje be nereikalingų priedų.

„BACK TO LIFE“ – „Biofarmacijos“ kruopščiai atrinkta formulė iš mineralų, vitaminų ir augalinių ekstraktų kasdieniai energijai ir organizmo atstatymui.

Maisto papildai*

-50%

WALMARK – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI



SUPER VITAMINAS C - prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Praturtintas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą. **MEGA VITAMINAS D 4000 IU** - didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. **CINKAS** - aukštos kokybės cinkas grožiui ir imunitetui! Padeda palaikyti normalią nagų, plaukų odos ir kaulų būklę. Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Visos dienos dozė vienoje tabletėje! **SALUTIL FORTE** - 5 mlrd. gyvų laktų ir bifido bakterijų kiekvienoje kapsulėje. **URINAL AKUT** - unikalus spanguolių ekstrakto, paprastosios rykštenės ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastoji rykštenė padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.

Maisto papildai*

-50%



DANDUM gelis, 100 g.

Medicinos priemonė

Šaldančio efekto gelis. Užtikrina ilgalaikį vėsinimo efektą po įvairių traumų, patempimų, sumušimų. Mažina skausmą, uždegimą, tinimą, mėlynės. DANDUM taip pat padeda atpalaiduoti raumenis po fizinio krūvio. Tinka vaikams nuo 2 metų amžiaus. Naudojimas. Suaugusiems ir vaikams nuo 2 metų amžiaus 3–4 kartus per dieną įtrinti skaudamą vietą.

7 04 €



DEEP RELIEF 50 mg/30 mg/g gelis, 50 g

Nereceptinis vaistinis preparatas**

1 g gelio yra 50 mg ibuprofeno ir 30 mg levomentolio. Terapinės indikacijos: Lokalūs sąnario aplinkos minkštųjų audinių uždegimo ir (ar) traumas (pvz., patempimo, išnirimo) sukelti skausmo malšinimas. Dozavimas: Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: gelį vartoti iki 3 kartų per parą, bet ne dažniau kas 4 valandas. Tepti reikia apie 1–4 cm gelio iš 50 g pakuotės. Viename centimetre gelio iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 50 mg ibuprofeno. 4 cm iš 50 g tubelės yra vidutiniškai 125 mg ibuprofeno. Neviršyti nurodytų dozių. Jeigu simptomai nepraeina per penkis dienas, kreiptis į gydytoją. Vaikų populiacija: Duomenų apie „Deep Relief“ saugumą ir veiksmingumą jaunesniems kaip 12 metų vaikams nėra. Vartojimo metodas: Plonu gelio sluoksniu tepti skaudamą vietą, švelniai masazuoti, kol susigers. Kontraindikacijos: Padidėjęs jautrumas veikliąsiai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas aspirinui ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, įskaitant ir vartojamus per burną. Astma sergantiems pacientai, kuriems aspirinas arba kiti nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, gali sukelti astmos priepuolį, niežėjimą, rinitą ar dilgėlinę. Nubrodzinta, pažeista infekcijos ar uždegimo oda arba plotai be viršutinio odos sluoksnio. Kiti toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu lokaliai vartojami vaistiniai preparatai. Vartojimo vietoje esanti infekcija. Paskutines nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: „Deep Relief“ gelio sudėtyje yra propilenglikolio, kuris gali sukelti odos sudirginimą. Gelio netepti ant (arba) šalia gleivinių ir akių. Netinka tepti po sandarinamųjų tvarsių. Pirmą kartą išbandyti ant mažo odos ploto. Vartoti tik ant odos. Registratojas ir gamintojas: The Mentholatum Company (Ireland) Limited, Airija.

7 74 €



ALGOPRALL 23,2 mg/g gelis, 100 g.

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklioji medžiaga ir stiprumas. Viena gramė Algoprall 23,2 mg/g gelio yra 23,2 mg diklofenako dietilamino, atitinkanti 20 mg diklofenako natrio druskos. Terapinės indikacijos. Suaugusiems ir 14 metų bei vyresniems paaugliams. Lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo, susijusio su lokalios raumenų ar sąnarių traumomis, malšinimas. Suaugusiems (18 metų ir vyresniems). Vietinio, lengvo ir vidutinio sunkumo degeneracinių sąnarių ligų, pavyzdžiui, osteoartrito (pirštų, kelių), sukeltos skausmo malšinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Tėpti du kartus per dieną, ryte ir vakare. Raumenų ir sąnarių traumų atveju gelio negalima vartoti ilgiau kaip 14 dienų. Kelio ir pirštų osteoartrito atveju gydymo trukmė yra iki 21 dienos. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas diklofenakui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Trečiasis nėštumo trimestras. Vaikai ir jaunesni kaip 14 metų paaugliai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientai, sergantys astma, šienlige, nosies gleivinės paburkimu, lėtine obstrukcine plaučių liga, lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis, taip pat esant odos pažeidimams. Pacientai, naudodami ALGOPRALL gelį, turėtų vengti būti saulėje, įskaitant soliariumą. Reklamos teksto parengimo data 2026-06.

3 56 €



FENODEX, 25 mg, 10 plėvelė dengtų tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklioji medžiaga ir stiprumas. Vienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 25 mg deksketoprofeno kaip deksketoprofeno trometamolio. Terapinės indikacijos. Simptominis lengvo ir vidutinio stiprumo raumenų ir kaulų, skausmingų mėnesinių, dantų skausmo gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Rekomenduojama vartoti po vieną 25 mg tabletę kas 8 valandas. Visa paros dozė neturi būti didesnė kaip 75 mg. Kontraindikacijos. Alergija deksketoprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, alergija acetilsalicilo rūgščiai, peptinė opa, kraujavimas iš skrandžio ar žarnyno arba praėjusio laiko kraujavimas iš skrandžio ar žarnyno, išopėjimas ar perforacija; yra nustatyti lėtinio virškinimo sutrikimai (sutrikęs virškinimas, rėmuo). lėtinis virškinimo trakto ligos (Krono liga ar opinis kolitas); nustatytas sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; nustatytas polinkis kraujuoti ar kraujo krešumo sutrikimas, trečiasis nėštumo trimestras ir žindymo laikotarpis. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Fenodex dėl anamnezėje pasireiškusių alerginių reakcijų, jei sergate inkstų, kepenų ar širdies ligomis, jeigu vartojate šlapimą varančių vaistų, jeigu sergate kraujodaros sistemos ligomis; sisteminė raudonoji vilkligė ar mišriomis jungiamojo audinio ligomis, jei sergate ar sergate lėtinėmis virškinimo trakto ligomis, jeigu vartojate kitų vaistų, kurie padidina peptinės opos ar kraujavimo riziką. FENODEX vaikams ir paaugliams vartoti negalima. Reklamos teksto parengimo data 2026-06.

-20%

VEIKSMINGA, TYRIMAIS PAGRĮSTA APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES ODAI!

RELIZEMA spray&go – zinc + panthenol purškalkas 100 ml RELIZEMA baby care kremas 100 ml

Kosmetikos priemonės

Produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir panthenolis – vienoje formulėje! Puikiai tinka odai raminti bei apsaugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač sauskelnių srityje, ant odos sudarydami apsauginę plėvelę, saugančią nuo išorinių dirgiklių. Kliniškai įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.

RELIZEMA™ spray&go - zinc + panthenol purškalkas - be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo.

RELIZEMA™ priemonės rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia.

Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB Berlin Chemie Menarini Baltic, J. Jasinskio str. 16a, LT-03163 Vilnius, Lithuania



10 59 €



BETADINE® makšties ovulės, 7 vnt. makšties uždegimo gydymui

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje ovulėje yra 200 mg joduoto povidono. Terapinės indikacijos. Ūminio ar lėtinio mišrios, nespecifinės (sukelto Gardnerella vaginalis), grybelių ar Trichomonas vaginalis infekcijos sukeltos vaginito gydymas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms gydant lengvą infekcinę ligą, rekomenduojama vartoti vieną ovulę per parą 7 paras. Kai infekcinė liga yra įsisenėjusi, vaistinio preparato galima vartoti du kartus per parą ir gydyti ilgiau. Gydymo ovulėmis nereikia nutraukti ir jį galima tęsti, jei atsiranda menstruacinis kraujavimas. Betadine ovulės draudžiama vartoti mergaitėms iki lytinio subrendimo. Vartoti j makštį. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Ilgalais vartojimas gali sukelti dirginimą, kontaktinį dermatitą ir padidėjusį jautrumą. Jei pasireiškia dirginimas ar padidėjęs jautrumas, vartojimą reikia nutraukti. Vartojant joduoto povidono gali atsirasti laikinas odos spalvos pakitimas, kurį sukelia paties vaistinio preparato spalva. Rekomenduojama stebėti ankstyvuosius galimos hipertirozės simptomus ir, jei reikia, tirti skydliaukės funkciją. Pacientėms, sergančioms inkstų nepakankamumu, vaistinio preparato vartoti atsargiai. Tuo pat metu draudžiama vartoti preparatų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Skydliaukės funkcijos sutrikimas. Diuringo (Dühring) pusulinis dermatitas. Prieš pradėdant vartoti radioaktyvių jodą, jo vartojimo metu ir pabaigus jo vartoti Nėštumas ir žindymo laikotarpis. Reklamos teksto parengimo data 2026 08.

-15%



„Gowipes“ higienos priemonės kasdieniui švarai ir komfortui! Švelnios odai, patogios naudoti namuose ir kelionėse!

Antibakterinio poveikio bei dezinfekcinės servetėlės padeda palaikyti rankų ir paviršių higieną, o drėgnas tualetinis popierius suteikia papildomo švaros ir gaivos pojūtį.

iki -40%

NEPRIEKAIŠTINGAI SLAUGAI IR HIGIENAI



Taikoma visam TENA asortimentui



Sauskelnės, įklotai, paklotai ir odos priežiūros priemonės – tai būtinos priemonės šlapimo nelaikymui kontroliuoti. „TENA“ sauskelnės, įklotai ir paklotai greitai sugeria ir sukaipo šlapimą viduje, todėl paviršius išlieka sausas ir nedirgina odos. Kvapo neutralizavimo sistema efektyviai apsaugo nuo nemalonaus kvapo atsiradimo. „TENA“ odos priežiūros priemonės švelniai valo ir drėkina net gležną, sausą ir pažeidžiamą odą. Patikrinta dermatologų.

VAISTINIŲ KONTAKTAI

 VILNIUS Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642 Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520	 GIRKALNIS Šetupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523 Raseinių raj.
 KAUNAS V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826	 GRINKIŠKIS Tilto g. 13-2, tel. (0 422) 63 388 Radviškio raj.
 MASTAČIAI Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144 Kauno raj.	 GRIŠKABŪDIS Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266 Šakių raj.
 KLAIPĖDA Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914	 JONIŠKĖLIS Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219 Pasvalio raj.
 ŠIAULIAI Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879	 KAIŠIADORYS Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745
 ALYTUS Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088	 KRUONIS Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106 Kaišiadorių raj.
 BUTRIMONYS Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244 Alytaus raj.	 MICKŪNAI Mickūnų g. 3, tel. (0 522) 34 206 Vilniaus raj.
 MIROSLAVO K. Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587 Alytaus raj.	 SASNAVA Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511 Marijampolės raj.
 DRUSKININKAI Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008	 SEIRIJAI Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939 Lazdijų raj.
 ELEKTRĖNAI Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415	 SIMNAS Alytaus g. 10, tel. (0 315) 426 16 Alytaus raj.
 ABROMIŠKIŲ K. Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310 Elektrėnų sav.	

Užsisakykite prekes internetu www.100metu.lt
ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!



VAISTINĖS - PARTNERĖS

BALBIERIŠKIS
Prienujų raj.

„Guobos vaistinė“
Vilniaus g. 107
tel. (0 319) 59 280

KALVARIJA
Marijampolės raj.

„Kalvarijos vaistinė“
Ugniagesių g. 9
tel. (0 343) 21 257

MARIJAMPOLĖ

„Gubojos vaistinė“
R. Juknevičiaus g. 72-1
tel. (0 343) 97 372

IŠLAUŽAS
Prienujų raj.

„Vitalijos vaistinė“
Kauno pl. 1
tel. (0 698) 45 977

KĖDAINIAI

„Kaštonų vaistinė“
J. Basanavičiaus g. 10
tel. (0 347) 67 244

KURŠĖNAI

„Kuršėnų vaistinė“
Vytauto g. 5
tel. (0 415) 85 747

iki **-30%**

Taikoma perkant
2 ar daugiau SENI prekių



Platus **SENI** sueriamųjų produktų asortimentas skirtas žmonėms, kurie susiduria su šlapimo nelaikymu. **SENI CARE** specializuotos kosmetikos produktai leis švelniai nuvalyti odą, ją atkurti ir efektyviai apsaugoti, daugumoje produktų nėra gyvulinės kilmės medžiagų ir jie paženklinėti „Vegan“ ženkluku.

-30%

Taikoma visam Bella asortimentui



BELLA higieniniai paketai ir kasdieniniai įklotai - ploni, diskretiški, daug sugeriantys ir laidūs orui. Vatos gaminiai - iš 100% medvilnės.

Pasūlymai galioja 2026 m. rugsėjo 1-30 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

Daugiau informacijos rasite www.ramunelesvaistine.lt ir www.100metu.lt