

SPALIO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2026 10 01 - 2026 10 31



biofarmacija
CAPS

Ta pati kokybė.
Dabar – kapsulėse.

NAUJIENA. „Biofarmacija CAPS“ linija sukurta tiems, kurie vertina švarias sudėtis, veiksmingus derinius ir kasdienį patogumą. 7 tikslinės formulės – **psichologinei pusiausvyrai** (magnio bisglicinas), **imunitetui** (cinkas, liposominis vitaminas D, vitaminas C iš erškėtuogių ekstrakto), **energijai ir kasdieniam balansui** (patentuotas grynas ašvagandų šaknų ekstraktas, rodiolės ir valerijono ekstraktai).

Be nereikalingų priedų. Tik veikliosios medžiagos mokliškai pagrįstose „Biofarmacija“ formulėse, kuriomis pasitikite jau 15 metų.

Premium lizdinė pakuotė maksimaliai apsaugota nuo išorinės pažeidos ir higieniška kasdieniam vartojimui.

Biofarmacija CAPS.
Gryna. Veiksminga. Patogu.

Maisto papildai



Mineralai iš
Negyvosios
jūros

1+1

KURIAMA TIK TAI,
KO ORGANIZMUI IŠ TIESŲ REIKIA



„Biofarmacija“ maisto papildai sukurti kasdieniam organizmo balanso palaikymui. Produktų sudėtyje naudojami natūralios kilmės Negvosios jūros mineralai, vertinami dėl savo grynumo ir unikalių mineralinės sudėties. Miltelių forma - patogus būdas geresniam pasisavinimui, švelniam poveikiui organizmui, be nereikalingų priedų.

Maisto papildai*

-40%



„INOLAB“ linija – sukurta Šveicarijoje, pasižymi sinerginiu sudedamųjų dalių poveikiu.

INOLAB Atsparumas stresui, 30 kapsulių - tai 8 aktyviųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron®“ šafrano ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, teigiamą nuotaiką ir padeda atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

INOLAB Stiprus magnis, 20 paketėlių - tai magnio, kurkumino ir piperino kompleksas nervų gyvenimo būdui. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. „Cavacurmin®“ kurkuminas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę.

INOLAB Širdžiai ir cholesterolio balansui, 30 kapsulių - tai 4 aktyviųjų medžiagų kompleksas jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. „ABG25+®“ juodųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-Te™“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

Maisto papildai*



FLAVAMED 30 mg tabletės N20 4 05 €

FLAVAMED 60 mg šnypščiosios tabletės N10 5 26 €

FLAVAMED 15 mg/5 ml geriamasis tirpalas 100 ml 4 26 €

FLAVAMED 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas 100 ml 4 49 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pašalinti. Geriamasis tirpalas vartojamas po valgio naudojant matavimo šaukštą. Šnypščiosios tabletės ištrinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. 30 mg tabletės reikia nuryti nesukramtytas po valgio, užsigeri pakankamu skysčio kiekiu. Suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą. 6-12 metų vaikams po 15 mg ambroksolio hidrochlorido 2-3 kartus per parą, 2-5 metų vaikams po 7,5 mg 3 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4 - 5 dienas Flavamed vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 30 mg tablečių negalima vartoti vaikams iki 6 metų. Flavamed 60 mg šnypščiosių tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. Flavamed 30mg/5ml ir 15 mg/5ml geriamojo tirpalo negalima vartoti vaikams iki 2 metų. Specialūs įspėjimai. Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; esant histamino netoleravimui. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Flavamed, jeigu jums praityje pasitaikė labai sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų (Stivenso-Džonsono sindromas ir Lajelio sindromas). Flavamed 15 mg/5 ml ir 30 mg/5 ml geriamajame tirpale bei šnypščiosiose tabletėse yra sorbitolis bei benzenkarboksirūgštis. Sorbitolis gali sukelti skrandžio ir žarnyno diskomfortą ir lengvą vidurių laisvinantį poveikį. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad Jūs (ar Jūsų vaikas) netoleruojate kokių nors angliavandenių arba Jums (ar Jūsų vaikui) nustatytas retas genetinis sutrikimas (gimtas fruktozės netoleravimas prieš vartodami šio vaisto (ar prieš duodami jo Jūsų vaikui), pasakykite gydytoju. Flavamed šnypščiosiose tabletėse yra benzilo alkoholio, kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Dėl susikaupimo ir toksinio poveikio rizikos (metabolinės acidozės) dideli kiekiai turi būti vartojami atsargiai ir tik tuo atveju, jeigu būtina, ypač neščioms ar žindančioms moterims, asmenims, kuriems yra kepenų arba inkstų pažeidimas. Galimos odos alerginės reakcijos. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com LT-FLA-7-2025_MFLOW, 2025/12

KARŠČIAVIMO MAŽINIMUI IR SKAUSMO MALŠINIMUI

IBUSTAR 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams 100ml 4 35 €

IBUSTAR 40 mg/ml geriamoji suspensija vaikams. 100ml 7 29 €



Nereceptinis vaistinis preparatas**

Viename geriamosios suspensijos ml yra 20 mg arba 40mg ibuprofeno. Ibustar yra uždegimą slopinantis ir skausmą malšinantis vaistinis preparatas (nesteroidinis vaistas nuo uždegimo), pasižymintis karščiavimą mažinančiomis savybėmis. Ibustar vartojamas trumpalaikiam simptominiam gydymui: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, karščiavimo. Ibustar 20mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams, sveriantiems nuo 5 kg iki 29 kg (kurių amžius nuo 6 mėnesių iki 9 metų). Ibustar 40 mg/ml geriamoji suspensija tinka vaikams sveriantiems 10 kg ir daugiau (1 metų ir vyresniems), paaugliams ir suaugusiems. Tinka vartoti tik per burną ir trumpai. Jeigu šio vaistinio preparato vaikams ir paaugliams reikia vartoti ilgiau kaip 3 dienas, arba jeigu ligos požymiai blogėja, pasitarkite su gydytoju. Prieš vartojimą buteliuką supurtkite. Ibustar vartoti negalima: jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu praityje buvo bronchų spazmas, astma, nosies gleivinės paburkimas, angioedema ar odos reakcijos po acetylsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo; jeigu yra neiškiš kraujodaros sutrikimų; jeigu buvo kraujavimas iš virškinimo trakto ar jo prakiurimas, susijęs su ankstesniu NVNU vartojimu; jeigu yra ar buvo praityje skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opa arba kraujavimas; jeigu yra kraujavimas į smegenis arba kitoks kraujavimas; jeigu yra sunkus inkstų, kepenų funkcijos ar sunkus širdies nepakankamumas; netekus daug skysčių; jeigu yra paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Salutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jeigu Jūsų vaikai atsiranda skrandžio kraujavimas ar išopėjimas, nutraukite Ibustar vartojimą. Nedelsiant informuokite gydytoją, jeigu atsiranda bet koks neįprastas simptomas pilve. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gal slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali veltinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdami infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėžybiniais ligomis reikia vengti vartoti Ibustar. LT_Ibu_01_2024_V1_print UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com



GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak.

7⁹⁹ €

GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak.

7⁵⁰ €

GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg
milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak.

8⁶⁸ €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje: „Griplex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido; „Griplex Thermal“ 650/50/10 mg: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Griplex Thermal“ 300/20/5 mg: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Griplex Thermal“ 650/50/10 mg arba „Griplex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4–6 val. „Griplex Thermal“ 300/20/5 mg: 6–12 m. vaikams: 1 paketėlis kas 4–6 val.; suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1–2 paketėliai kas 4–6 val. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnės nei rekomenduojama dozės. Pasakykite gydytojiui, jei jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių amonių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metemoglobino reduktazės stoka; sunkus kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.



GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tab.

6¹³ €

GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tab.

8⁹⁶ €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tab.

6⁴⁸ €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tab.

9²⁵ €

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Griplex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrochlorido. 1 tabletėje „Griplex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Griplex 325/30/10 mg“ suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3–4 kartus per parą, kas 4–6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Griplex 500/30/15 mg“ suaugusiesiems po 1–2 tabletes 3–4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; lėtinis alkoholizmas. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai: atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydančiais šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas jūsų savijauta nepagerėja arba net pablogėja, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31

13⁷² €



DIFORTAN, 100 mg/g, gelis, 100 g

*Nereceptinis vaistinis preparatas***

Veikliosios medžiagos, stiprumas: kiekviename „Difortan“ gelio grame yra 100 mg etofenamato. Terapinės indikacijos: lengvų arba vidutinio stiprumo raumenų skausmų, kraujosruvų, potrauminio skausmo, lengvo arba vidutinio stiprumo raumenų skausmo (osteoartrito / osteoartrito), lengvo arba vidutinio stiprumo sąnarių skausmo, sinovito, (neinfekcinio) artrito, bursito, tendinito, vidutinio sunkumo su raumenų ir skeleto sistema susijusio uždegimo, t. y. potrauminės ar reumatinės kilmės, lokalaus gydymas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems kasdien 3–4 kartus per parą, 14 parų, dozės kiekis atitinka nuo 2,5 iki 5 cm išspausito gelio. Kontraindikacijos: vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai ar ant egzemos pažeistų paviršių, atvirų žaizdų, vietų su opomis ar pažeidimais. Specialūs įspėjimai: „Difortan“ negalima tepti ant gleivinių arba ant akių. Galimas padidėjęs jautrumas dėl kryžminės reakcijos su kitais uždegimus malšinčiais vaistiniais preparatais rizikos. Kontaktinės fotoalergijos rizika, todėl saugoti nuo saulės spindulių. Negalima atmesti sisteminio poveikio reiškinį galimybes, todėl pacientams, kuriems yra inkstų ar kepenų nepakankamumas, šį vaistinį preparatą reikia vartoti atsargiai. Pasitarti su gydytoju, jeigu būklė nepagerėja arba jei po 7 parų būklė pablogėja. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-19.

1+1



HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių

Medicinos priemonė

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių

*Maisto papildai**

HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, aviečių ir obuolių skonio ledinukai, 4 vnt.

HERBITASSIN® be cukraus miško uogų skonio ledinukai, 4 vnt.

Maisto produktas

Herbitassin® įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimo simptomus.

NUO PERŠALIMO.
PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!



**DALERON COLD3 325 mg/30 mg/15 mg
plėvele dengtos tabletės N12 arba N24**

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobrodido. Terapinės indikacijos. Peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinių, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persirgęs miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantis insulto rizikos faktorius. Sergama lėtiniu alkoholiizmu, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonąja vilklige, cukriniu diabetu, hipertiroidizmu ar badaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvę traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

5.52€

ATSIKOSĖK LENGVIAU
SU HALIXOL!



HALIXOL® 15 mg/5 ml sirupas

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Nuo kosulio ir peršalimo.

Veikliosios medžiagos stiprumas. Kiekviename ml sirupo yra 3 mg, tabletėje yra 30 mg ambrosolio hidrochlorido. Terapinės indikacijos. Gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis obstrukcinėmis kvėpavimo takų ligomis, pvz., bronchų astma, bronchitu, bronhektazija, kurių metu atsiranda patologiškai tirštų gleivių ir skreplių. Dozavimas ir vartojimo metodas. Sirupas: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams reikia vartoti po 10 ml sirupo 3 kartus; 6–12 metų vaikams dozė yra 5 ml 2–3 kartus per parą; 2–5 metų vaikams dozė yra 2,5 ml 3 kartus per parą; jaunesniems kaip 2 metų vaikams–2,5 ml 2 kartus per parą. Tabletės: suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų paaugliams reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per parą. Rekomenduojama dozė 6–12 metų vaikams yra ½ tabletės 2–3 kartus per parą. Vaikams jaunesniems nei 6 metų nerekomenduojama. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Vartojant Halixol reikia atsižvelgti į padidėjusio jautrumo reakcijas. Jei yra progresuojančio odos išbėrimo (kartais susijusio su pūslelėmis ar gleivinės pažeidimais) simptomų ar požymių, reikia nedelsiant nutraukti gydymą. Jei sutrikusi bronchų motorika ir padidėjusi gleivių sekrecija, yra inkstų ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas. Tablečių sudėtyje yra laktozės. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai ar bet kuriai 6.1 skyriaus nurodytai pagalbinei medžiagai. Virškinimo trakto opinės ligos. Pirmaisiais trimis nėštumo mėnesiais sirupo vartoti nerekomenduojama. Registruotojas. Egis Pharmaceuticals PLC 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38 Vengrija. Čia pateiktas sutrumpintas vaistinio preparato aprašas. Išsamni informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt>. Reklamos teksto parengimo data 2025 05.

NUMALŠINA SKAUSMĄ
NET IKI 12 VAL.!



**NALGESIN S 275 mg plėvele dengtos tabletės, N10
NALGESIN S 275 mg plėvele dengtos tabletės, N20**

Nereceptinis vaistinis preparatas**

5.40€

Skirtas galvos, dantų, mėnesinių, sąnarių, raumenų, potrauminiams, pooperaciniams skausmams malšinti. Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 275 mg natrio naprokseno. Vartojimas: suaugusiems ir vyresniems kaip 18 metų paaugliams iš pradžių vartojama 1-2 tab., vėliau – po 1 tab. kas 8-12 val. Vaikams ir paaugliams iki 18 metų Nalgesin S plėvele dengtų tablečių vartoti negalima, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nėra. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai preparato medžiagai, buvusi alerginė reakcija, kurią sukėlė nesteroidiniai vaistiniai preparatai nuo uždegimo, aktyvi ar atsinaujinanti skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, kraujavimas iš virškinamojo trakto, sunkus širdies nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: naproksenu gydoma pacienta, serganti epilepsija ar porfirija, kuriai buvo ar yra virškinamojo trakto sutrikimų, ypač opinis kolitas ar Krono liga, privalo stebėti gydytojas. Naproksenu draudžiama vartoti, jei yra sunki nesena žaizda arba iki didelės operacijos liko mažiau kaip 48 valandos. Reklamos teksto parengimo data: 2024 09 18

4.49€



**EFFERALGAN 80 mg žvakutės N10
EFFERALGAN 150 mg žvakutės N10**

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Kiekvienoje žvakutėje yra 80 mg arba 150 mg paracetamolio. Terapinės indikacijos. EFFERALGAN 80 mg žvakutės ir EFFERALGAN 150 mg žvakutės: Simptominis lengvo ir vidutinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. Vartojimo metodas ir dozavimas. EFFERALGAN 80 mg žvakutės ir EFFERALGAN 150 mg žvakutės: vartoti į tiesiąją žarną. Vaikams paracetamolis dozuojamas pagal kūno svorį. Leidžiama maksimali paracetamolio paros dozė yra 60 mg/kg. Ji padalijama į 4 vienkartinės, t. y. vartojama maždaug po 15 mg/kg kas 6 val. Vaikui jo reikia vartoti lygiais intervalais dieną ir naktį (ne dažniau kaip kas 6 val.). Nuo 5 iki <10 kg (nuo 2 iki <24 mėnesių) – 1 80 mg žvakutė kas 6 val. (didžiausia paros dozė: 320 mg). Nuo 10 iki <15 (nuo 24 mėnesių iki <3 metų) – 1 150 mg žvakutė kas 6 val. (didžiausia paros dozė: 600 mg). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. EFFERALGAN 80 mg žvakutės ir EFFERALGAN 150 mg žvakutės: Viduriavimas. Neseniai persirgęs tiesiosios žarnos arba analinės angos uždegimas, neseniai buvęs kraujavimas iš tiesiosios žarnos. Alergija žemės riešutams ar sojai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Patikrinkite, ar pacientas nevartoja kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Atsargumo priemonių reikia pacientams, sergantiems lengvu ar vidutinio sunkumo kepenų nepakankamumu, įskaitant Žilberto sindromą; pacientams, sergantiems sunkiu inkstų funkcijos sutrikimu; pacientams, kai yra ilgalaikė bloga mityba, anoreksija, kacheksija, bulimija, badavimas; kai yra gliukozės-6-fosfato dehidrogenazės stoka; kai yra dehidratacija, hipovolemija. Ilgą laiką (>3 mėnesius), kas dvi dienas ar dažniau, vartojant skausmą malšinančių vaistų pacientams, sergantiems lėtiniu galvos skausmu, gali atsirasti arba paūmėti galvos skausmas, kuris neturi būti gydomas didinančiomis dozėmis. Paracetamolis gali sukelti sunkių odos reakcijų, kurios gali būti mirtinos. Įtariant piroglutamato acidozės sukeltą PATMA, rekomenduojama nedelsiant nutraukti paracetamolio vartojimą ir atidžiai stebėti. EFFERALGAN 80 mg žvakutės ir EFFERALGAN 150 mg žvakutės: dėl lokalios toksinio poveikio tiesiajai žarnai pavojaus žvakūčių nerekomenduojama vartoti daugiau kaip 4 kartus per parą, o jų vartojimo trukmė turi būti kiek įmanoma trumpesnė. Sudėtyje sojų lecitino, vaisto negalima vartoti ar skirti pacientams, kurie yra alergiški žemės riešutams arba sojai. Reklamos teksto parengimo data 2026 09.

1 83 €

EFEKTYVIAI MALŠINA SKAUSMĄ
IR MAŽINA TEMPERATŪRĄ



IBUSTAR 400 mg plėvele dengtos tabletės, N10

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Indikacijos: Simptominis silpno ar vidutinio stiprumo skausmo gydymas. Simptominis karščiavimo gydymas. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų vienkartinė dozė yra ½–1 tabletė per parą. Didžiausia paros dozė yra 1200 mg (3 Ibustar plėvele dengtos tabletės). Vaikams Ibustar vienkartinė dozė 20 kg–29 kg (6-9 metai) ir 30 kg–39 kg (10–11 metų) yra ½ tabletės. Didžiausia paros dozė 20–29 kg - 1½ ir 30–39 kg - 2 tabletės. Vienkartinės dozės geriamos ne dažniau nei kas 6 valandos. Kontraindikacijos. Ibustar vartoti draudžiama: jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; jeigu Jums, pavartojus acetilsalicilo rūgšties turinčių vaistų arba kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, yra buvę alerginių reakcijų, tokių kaip astmos priepuoliai; nosies gleivinės paburkimas; odos reakcijos; jeigu yra nežinomos kilmės kraujodaros sutrikimų; jeigu Jums yra aktyvi arba pasikartojanti skrandžio arba plonosios (dvylikapirštės) žarnos opa arba kraujavimas; jeigu Jums yra buvęs su ankstesniu NVNU gydymu susijęs kraujavimas iš virškinimo trakto arba jo perforacija; jeigu Jums yra galvos smegenų kraujagyslių arba kitoks aktyvus kraujavimas; jeigu Jums yra sunkus kepenų arba sunkus inkstų nepakankamumas; jeigu Jums yra sunkus širdies nepakankamumas; jeigu Jums yra paskutiniai trys mėnesiai; vaikams, kurių svoris yra mažesnis nei 20 kg (jaunesniems nei 6 metai). Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Ibustar. Šalutinis poveikis gali sumažėti vartojant mažiausią veiksmingą vaisto dozę trumpiausią laiką būtiną simptomų kontrolei. Ibustar reikia vengti vartoti kartu su kitais NVNU, įskaitant COX-2 inhibitorius. Jei vartojant Ibustar pasireiškia kraujavimas iš virškinimo trakto arba opėjimas, vaisto vartojimą būtina nutraukti. Pastebėję bet kurį alerginės reakcijos į šį vaistą požymį ar sunkių odos reakcijų simptomus, nedelsdami nutraukite Ibustar vartojimą ir kreipkitės į gydytoją arba greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Ibustar gali slėpti tokius infekcijos simptomus kaip karščiavimas ir skausmas. Todėl Ibustar gali vėlinti tinkamą infekcijos gydymą, ir dėl to gali padidėti komplikacijų rizika. Jei vartojate šį vaistą sirgdamiesi infekcine liga ir simptomai išlieka arba blogėja, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Sergant vėžraupiais reikia vengti vartoti Ibustar. LT_Ibu_05_2024_V1 print Reklama paruošta 2024 m. rugsėjo mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTI“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

-50%



DR. MÜLLER pastilės gerklei, kvėpavimo takams

Maisto papildai*

Normaliai kvėpavimo sistemos, gerklės, ryklės, bei balso stygų funkcijoms palaikyti.

-40%

VIRONOX – NELEISK
TAVĘS SUSTABDYTI!



„VIRONOX“ epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų.

„VIRONOX GERKLEI“ čiulpiamosios tabletės vaikams ir suaugusiems. Sudėtyje esantis islandinių kerpenų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo (gerklės, ryklės ir balso stygų) sistemos funkciją.

Maisto papildas*

-40%



„CITO® FERRUM“ sudėtis pasižymi inovatyvia liposominės formos geležimi. Pasirinktas geležies pirofosfatas yra geriau pasisavinamas lyginant su kitomis geležies formomis. Geležies įsisavinimas iš geležies pirofosfato priklauso nuo geležies trūkumo laipsnio: kuo labiau šio mikroelemento trūksta organizme, tuo geresnis jos įsisavinimas. Nedirgina skrandžio bei neturi geležies poskonio. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalų deguonies pamešimą organizme. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią kraujodarą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

UŽGESINA RĖMENĮ ILGAM!

3 78 €



NOLPAZA 20 MG, 7 skrandyje neiros tablečių

NOLPAZA 20 MG, 14 skrandyje neirių tablečių

5 73 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veiklioji medžiaga, stiprumas: kiekvienoje skrandyje neiroje tableteje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). Terapinės indikacijos. Trumpalaikis suaugusių žmonių gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgšties regurgitacijos) gydymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Rekomenduojama pantoprazolo paros dozė yra 20 mg (viena tablete). Kad simptomai palengvėtų, tablečių gali reikėti gerti 2-3 dienas iš eilės. Kai simptomai visiškai išnyksta, gydymas turi būti nutrauktas. Nepasitarus su gydytoju, gydymas negali trukti ilgiau kaip 4 savaites. Nolpaza nerekomenduojama vartoti vaikams ir jaunesniams kaip 18 metų paaugliams, nes duomenų apie saugumą ir veiksmingumą nepakanka. Nolpaza 20 mg skrandyje neirių tablečių negalima kramtyti arba smulkinti, jas reikia nuryti nesmulkintas užgeriant skysčiu prieš valgį. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nerekomenduojama pantoprazolo vartoti kartu su ŽIV proteazės inhibitoriais, pvz., atazanaviru, nefinaviru, nes reikšmingai sumažėja tokių vaistinių preparatų biologinis prieinamumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Pacientui turi būti paaiškinta, kad toliau išvardytas atvejis jis privalo kreiptis į gydytoją: netikėtai mažėja kūno svoris, yra anemija, kraujavimas iš virškinimo trakto, disfgalija, nuolatinis vėmimas ar vėmimas krauju. Tokie simptomai gali palengvėti, todėl sunki liga gali būti diagnozuojama vėliau. Tokiu atveju būtina paneigti vėžinio susirgimo diagnozę, yra buvusi skrandžio opa arba operuotas virškinimo traktas; 4 savaites ar ilgiau nuolat vartojama nevirškinimo ar rėmens simptomus lengvinančių vaistinių preparatų; yra gelta, kepenų funkcijos sutrikimas arba kepenų liga; yra bet kokia kita sunki liga, bloginanti bendrąją savijautą; pacientas vyresnis kaip 55 metų ir anksčiau simptomų nebuvo arba buvo simptomai pasikėitę. Simptomai gali pradėti lengvėti po maždaug vienos gydymo pantoprazolu dienos, tačiau kad rėmuo išnyktų visiškai, vaistinio preparato gali tekti vartoti 7 dienas. Pantoprazolo pacientai negali vartoti profilaktikai. Dėl padidėjusios chromogranino A (CgA) koncentracijos gali būti sunkiau atlikti neuroendokrininių navikų tyrimus. Nolpaza tableteje yra sorbitolio ir natrio. Geriamojo vaistinio preparato sudėtyje esantis sorbitolis gali paveikti kitų kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų biologinį prieinamumą. Šio vaistinio preparato tableteje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės. Reklamos teksto parengimo data. 2024-09-17

-40%



VITAMIN C PROLONG, 40 kapsulių

Maisto papildai*

„Vitamin C prolong“ kapsulės, kuriose yra ir prailginto veikimo patentuoto vitamino Ester-C®. Moksliniai tyrimai rodo, kad patentuota Ester-C forma organizme išlieka iki 24 valandų, nedirgina skrandžio, nėra toksiška kepenims, lėčiau pasišalina iš organizmo. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažeidos bei sumažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

RUTIN FORTE+C, 30 kapsulių

Maisto papildai*

„Rutin forte+C“ – silpnoms kraujagyslėms. Sudėtyje yra rutozido, vitamino C, cinko ir seleno. Normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, susidarymą padeda palaikyti vitaminas C.

-20%

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI, ENERGIJAI

MAGVIT B complex, N20 MAGVIT Plus, N42 MAGVIT Platinum, N30 MAGVIT GO, N8

Maisto papildas*



„Magvit Platinum“ - greitas ir ilgalaikis poveikis. Tablete magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tik 1 tablete per parą. „Magvit Plus“ skirtas raumenims, nervų sistemai ir širdžiai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, vitaminai B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Specialios ilgalaikio veikimo Depo formulės dėka, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tablete per parą. „Magvit B Complex“ sudėtyje yra 400 mg magnio ir 8 B grupės vitaminai. Tinka vartoti fizinio krūvio metu. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 paketėlį per dieną. „Magvit GO“ - raumenims, nervų sistemai, energijai. „Magvit GO“ buteliukuose esantis magnis gaunamas iš organinės formos ir jau išsitraipęs, todėl organizmas lengviau jį pasisavina, palyginus su įprastomis tabletėmis. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis taip pat padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Naudojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 14 metų gerti 1 buteliuką per dieną.

-40%



„B COMPLEX“, kapsulės N40

Maisto papildas*

Įvairių, gerai subalansuotų B grupės vitaminų derinys tiems, kurie jaučia nervinę įtampą bei nuovargį. Mažinti nuovargį, palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą padeda vitaminai B2, B6, B12. Normalią odos būklę padeda palaikyti vitaminai B2, biotinas ir niacinas, o normalią plaukų būklę – biotinas. Normalią protinę veiklą padeda palaikyti pantoteno rūgštis, kuria taip pat praturtinta šio preparato sudėtis. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

-40%



„TRIPTAN FORTE“ sudėtyje esantis 5-hidroksitriptofanas (5-HTP) yra natūrali medžiaga, gaunama iš Afrikoje augančių augalų – Griffonia simplicifolia – sėklų, kuri kartu su vitaminu B6 reikalinga serotonino – geros nuotaikos hormono – gamybai. Serotonino išsiskyrimas suteikia gerą nuotaiką ir energiją. Tai pat sudėtyje esantys vitaminai B1 ir B6 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir nervų sistemos veiklą. Vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

-40%



„Rami širdis“ linija – dvejopo poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

Maisto papildai*

-40%



Linija „**LIUBERIN**“ skirta padėti išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti akies kraujotaką. „**LIUBERIN superior**“ net 18 aktyviųjų medžiagų kompleksas sausoms, pavargusioms, daug į skaitmeninių įrenginių ekranus žiūrinčioms akims. Ginkmedžio ekstraktas padeda palaikyti akies kraujotaką. O „**LIUBERIN +LUTEIN 35 mg**“ – preparato sudėtis praturtinta karotenoidais: net 35 mg luteino ir 3 mg zeaksantino, kurių su amžiumi koncentracija akyse mažėja. Mėlynių ekstraktas padeda palaikyti normalią akių funkciją, vaizdo aiškumą ir kraujotaką. Normalų regėjimą padeda išsaugoti vitaminas A ir cinkas. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

*Maisto papildas**

-15%



BA muilai ir šampūnai – turtinga augalinės kilmės sudėtimi kūno ir plaukų priežiūra kiekvieną dieną!

-25%

ARGO AKIS

AKINIAI SKAITYMU!, kurių rėmelių dizainas patiks net ir išrankiausiems naudotojams.



-30%

ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA PATIKIMOSE RANKOSE



LEUKOPLAST®

Medicinos priemonės

Aukštos kokybės pleistrai, skirti nedidelėms žaizdoms, tokioms kaip įpjovimai, įbrėžimai, nubrodinimai ar įtrūkimai. Yra įvairių tipų pleistrai: sterilūs, atsparūs vandeniui ar apsaugantys nuo bakterijų patekimo į žaizdą, itin tvirtai prilipantys ar švelnūs odai. „Leukoplast elastomull haft“ – kibus elastinis bintas tvarsčių prilipimui ir fiksavimui. Unikalus tuo, kad limpa pats prie savęs, tačiau nelimpa prie odos. Išsirinkite tinkamiausias priemones savo pirmosios pagalbos vaistinėlei.

-30%

ziąja
Focus
on skin

Taikoma visam Ziaja asortimentui



ZIAJA - aukštos kokybės veido, kūno ir plaukų priežiūros kosmetika, pagrįsta veiksmingais ingredientais.

- Natūrali kilmė
- Aukštos kokybės receptūra
- Kainos ir kokybės santykis

-30%

Taikoma visam Aromatika asortimentui

AROMATIKA



AROMATIKA - natūralios kosmetikos priemonės Jums ir Jūsų šeimai!

VAISTINIŲ KONTAKTAI

 VILNIUS Žolyno g. 2A, tel. (0 5) 250 5642 Kęstučio g. 9, tel. (0 5) 212 6520	 GIRKALNIS Šetupio g. 36-2, tel. (0 428) 45 523 Raseinių raj.
 KAUNAS V. Krėvės pr. 43, tel. (0 37) 310 826	 GRINKIŠKIS Tilto g. 13-2, tel. (0 422) 63 388 Radviškio raj.
 MASTAČIAI Mokslo g. 11, tel. (0 37) 215 144 Kauno raj.	 GRIŠKABŪDIS Alyvų g. 1-3, tel. (0 345) 41 266 Šakių raj.
 KLAIPĖDA Mokyklos g. 13-50, tel. (0 46) 415 914	 JONIŠKĖLIS Vytauto g. 1, tel. (0 451) 20 219 Pasvalio raj.
 ŠIAULIAI Lyros g. 13, tel. (0 41) 552 879	 KAIŠIADORYS Gedimino g. 51A, tel. (0 346) 53 745
 ALYTUS Rotušės a. 14/8, tel. (0 315) 51 088	 KRUONIS Vilniaus g. 13, tel. (0 346) 57 106 Kaišiadorių raj.
 BUTRIMONYS Ateities g. 4, tel. (0 315) 79 244 Alytaus raj.	 MICKŪNAI Mickūnų g. 3, tel. (0 522) 34 206 Vilniaus raj.
 MIROSLAVO K. Dainavos g. 7, tel. (0 315) 55 587 Alytaus raj.	 SASNAVA Žaliosios g. 2-5, tel. (0 343) 28 511 Marijampolės raj.
 DRUSKININKAI Eglės g. 7, tel. (0 313) 56 008	 SEIRIJAI Vytauto g. 15-3, tel. (0 318) 51 939 Lazdijų raj.
 ELEKTRĖNAI Taikos g. 4-1, tel. (0 528) 34 415	 SIMNAS Alytaus g. 10, tel. (0 315) 426 16 Alytaus raj.
 ABROMIŠKIŲ K. Sanatorijos g. 72, tel. (0 528) 27 310 Elektrėnų sav.	

Užsisakykite prekes internetu www.100metu.lt ir atsiimkite Jums patogiausioje vaistinėje!



VAISTINĖS - PARTNERĖS

BALBIERIŠKIS
Prienuj raj.

„Guobos vaistinė“
Vilniaus g. 107
tel. (0 319) 59 280

KALVARIJA
Marijampolės raj.

„Kalvarijos vaistinė“
Ugniagesių g. 9
tel. (0 343) 21 257

MARIJAMPOLĖ

„Gubojos vaistinė“
R. Juknevičiaus g. 72-1
tel. (0 343) 97 372

IŠLAUŽAS
Prienuj raj.

„Vitalijos vaistinė“
Kauno pl. 1
tel. (0 698) 45 977

KĖDAINIAI

„Kaštonų vaistinė“
J. Basanavičiaus g. 10
tel. (0 347) 67 244

KURŠĖNAI

„Kuršėnų vaistinė“
Vytauto g. 5
tel. (0 415) 85 747

-20%



DR.OHHIRA - produktai su mokslininko parašu!

*Maisto papildai**

Daugybę pasaulinių apdovanojimų pelnęs japonų mikrobiologas dr. Ichihiro Ohhira sukūrė unikalias formules, apjungiančias natūralią gydomųjų augalų galią, probiotinių mikroorganizmų savybes, senas japonų fermentacijos tradicijas ir šiuolaikinio mokslo technologijas. Visos formulės unikaliai savo puikiai subalansuota sudėtimi, sinerginiu sudedamųjų dalių veikimu ir daugiafunkciniu poveikiu organizmui.

Pasiūlymai galioja 2026 m. spalio 1-31 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

Daugiau informacijos rasite www.ramunelesvaistine.lt ir www.100metu.lt